

[Губка гемостатическая коллагеновая](#)



Код АТХ:

- [B02BC07](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Коллаген](#)
- [Борная кислота](#)
- [Нитрофурал](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН МНН МНН} [Википедия](#)^{МНН МНН МНН}
[РЛС](#) [VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакотерапевтическая группа:

- [Гематотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Гемостатическое средство для местного применения, оказывает антисептическое и адсорбирующее действие, стимулирует регенерацию тканей. Оставленная в ране или полости губка полностью рассасывается.

Показания к применению:

- капиллярные и паренхиматозные кровотечения;
- трофические язвы;
- пролежни;
- повреждения кожных покровов;
- носовые кровотечения;
- отит;
- кровотечения из синусов твердой мозговой оболочки;
- альвеолярное кровотечение;

- гемостаз на фоне стоматологических вмешательств;
- заполнение дефектов паренхиматозных органов.

Относится к болезням:

- [Альвеолит](#)
- [Отит](#)
- [Пролежни](#)
- [Синусит](#)
- [Стоматит](#)
- [Трофические язвы](#)

Противопоказания:

- гиперчувствительность;
- артериальное кровотечение.

Способ применения и дозы:

Местно, тампонируют рану. Через 3-5 мин губка, пропитавшись кровью, плотно прилегает к кровоточащей поверхности. В случае продолжающегося кровотечения накладывают второй слой губки. После остановки кровотечения губку фиксируют П-образным швом. Для усиления гемостатического эффекта губку можно смочить раствором тромбина.

Побочное действие:

Аллергические реакции; вторичное инфицирование.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Тромбин (при дополнительном смачивании) усиливает гемостатическое действие.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Gubka_gemostaticheskaya_kollagenovaya