

## Хелепин-Д



### Код АТХ:

- [D06BB](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

<b>Мазь для местного и наружного применения 1%</b>	<b>100 г</b>
экстракт травы десмодиума канадского (55% флавоноидов в пересчете на изоориентин и сухое вещество)	1 г
5 г - тубы алюминиевые (1) - пачки бумажные. 10 г - тубы алюминиевые (1) - пачки бумажные. 20 г - тубы алюминиевые (1) - пачки бумажные. 10 г - банки темного стекла (1) - пачки бумажные. 20 г - банки темного стекла (1) - пачки бумажные.	
<b>Мазь для местного и наружного применения 5%</b>	<b>100 г</b>
экстракт травы десмодиума канадского (55% флавоноидов в пересчете на изоориентин и сухое вещество)	5 г
5 г - тубы алюминиевые (1) - пачки бумажные. 10 г - тубы алюминиевые (1) - пачки бумажные. 20 г - тубы алюминиевые (1) - пачки бумажные. 10 г - банки темного стекла (1) - пачки бумажные. 20 г - банки темного стекла (1) - пачки бумажные.	
<b>Экстракт сухой</b>	<b>1 банка</b>
экстракт десмодиума канадского	300 г
Банки темного стекла.	
<b>Экстракт сухой</b>	<b>1 банка</b>
экстракт десмодиума канадского	600 г
банки темного стекла.	

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Хелепин-Д обладает высокой противовирусной активностью в отношении ДНК-содержащих вирусов группы герпеса, умеренной антимикробной активностью, стимулирует индукцию гамма-интерферона и оказывает иммуностимулирующее действие в отношении клеточного и гуморального иммунитета.

## Показания к применению:

- заболевания, вызываемые Herpes simplex и Varicella zoster;
- острые и рецидивирующие формы простого герпеса генитальной и экстрагенитальной локализации;
- экзема Капоши;
- герпетические стоматиты;
- опоясывающий лишай;
- ветряная оспа.

## Относится к болезням:

- [Ветряная оспа](#)
- [Ветрянка](#)
- [Герпес](#)
- [Лишай](#)
- [Стоматит](#)
- [Экзема](#)

## Противопоказания:

- повышенная чувствительность к препарату.

## Способ применения и дозы:

Мазь Хелепина-Д применяют местно и/или наружно. На кожу **взрослым** применяют 5% мазь, **детям** - 1% мазь, на слизистые оболочки **взрослым** и **детям** применяют 1% мазь. Мазь наносят тонким слоем на пораженные участки без повязки 2-6 раз/сут.

При *острых и рецидивирующих формах простого герпеса*, в случае единичных высыпаний, длительность применения мази составляет 3-5 дней; при распространении высыпаний, а также при *генерализованных формах простого герпеса (экзема Капоши)* - от 7-10 дней до 3-4 недель.

При *вирусных заболеваниях слизистой оболочки полости рта, при генитальном герпесе, опоясывающем лишае, ветряной оспе* мазь наносят на пораженные участки 3-6 раз/сут. Минимальный курс лечения - 7-10 дней.

## Побочное действие:

Не выявлены.

## Особые указания и меры предосторожности:

Терапевтическое действие Хслепииа-Д наиболее выражено при его использовании в начальном периоде заболевания или рецидива.

При распространенных высыпаниях и наличии общих явлений (лихорадка, лимфаденопатия) при острых, рецидивирующих формах, а также генерализованных формах простого герпеса (экзема Капоши), генитальном герпесе, опоясывающем лишае, ветряной оспе, а также при вирусных заболеваниях слизистой оболочки полости рта, мазь назначают в комплексе с таблетками Хелепин-Д таблетки, покрытые оболочкой 0.1 г. При хроническом рецидивирующем течении заболевания возможно применение повторных курсов лечения.

## Условия хранения:

В защищенном от света месте, при температуре от 4° до 10°C. Хранить в недоступном для детей месте. Не

**Хелепин-Д**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

**Срок годности:**

3 года.

**Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Helepin-D>