Хелепин-Д



Код АТХ:

- D06BB

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Мазь для местного и наружного применения 1%***	**100 г**
экстракт травы десмодиума канадского (55% флавоноидов в пересчете на изоориентин и сухое вещество)	1 г

5 г - тубы алюминиевые (1) - пачки бумажные.
10 г - тубы алюминиевые (1) - пачки бумажные.
20 г - тубы алюминиевые (1) - пачки бумажные.
10 г - банки темного стекла (1) - пачки бумажные.
20 г - банки темного стекла (1) - пачки бумажные.

◊ ***Мазь для местного и наружного применения 5%***	**100 г**
экстракт травы десмодиума канадского (55% флавоноидов в пересчете на изоориентин и сухое вещество)	5 г

5 г - тубы алюминиевые (1) - пачки бумажные.
10 г - тубы алюминиевые (1) - пачки бумажные.
20 г - тубы алюминиевые (1) - пачки бумажные.
10 г - банки темного стекла (1) - пачки бумажные.
20 г - банки темного стекла (1) - пачки бумажные.

Экстракт сухой	**1 банка**
экстракт десмодиума канадского	300 г

Банки темного стекла.

Экстракт сухой	**1 банка**
экстракт десмодиума канадского	600 г

банки темного стекла.

Фармакотерапевтическая группа:

- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Хелепин-Д обладает высокой противовирусной активностью в отношении ДНК-содержащих вирусов группы герпеса, умеренной антимикробной активностью, стимулирует индукцию гамма-интерферона и оказывает иммуностимулирующее действие в отношении клеточного и гуморального иммунитета.

Показания к применению:

— заболевания, вызываемые Herpes simplex и Varicella zoster;

— острые и рецидивирующие формы простого герпеса генитальной и экстрагенитальной локализации;

— экзема Капоши;

— герпетические стоматиты;

— опоясывающий лишай;

— ветряная оспа.

Относится к болезням:

- Ветряная оспа
- Ветрянка
- Герпес
- Лишай
- Стоматит
- Экзема

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к препарату.

Способ применения и дозы:

Мазь Хелепина-Д применяют местно и/или наружно. На кожу **взрослым** применяют 5% мазь, **детям** - 1% мазь, на слизистые оболочки **взрослым** и **детям** применяют 1% мазь. Мазь наносят тонким слоем на пораженные участки без повязки 2-6 раз/сут.

При *острых и рецидивирующих формах простого герпеса*, в случае единичных высыпаний, длительность применения мази составляет 3-5 дней; при распространении высыпаний, а также при *генерализованных формах простого герпеса* (*экзема Капоши)* - от 7-10 дней до 3-4 недель.

При *вирусных заболеваниях слизистой оболочки полости рта, при генитальном герпесе, опоясывающем лишае, ветряной оспе* мазь наносят па пораженные участки 3-6 раз/сут. Минимальный курс лечения - 7-10 дней.

Побочное действие:

Не выявлены.

Особые указания и меры предосторожности:

Терапевтическое действие Хслепиии-Д наиболее выражено при его использовании в начальном периоде заболевания или рецидива.

При распространенных высыпаниях и наличии общих явлений (лихорадка, лимфаденопатия) при острых, рецидивирующих формах, а также генерализованных формах простого герпеса (экзема Капоши), генитальном герпесе, опоясывающем лишае, ветряной оспе, а также при вирусных заболеваниях слизистой оболочки полости рта, мазь назначают в комплексе с таблетками Хелепин-Д таблетки, покрытые оболочкой 0.1 г. При хроническом рецидивирующем течении заболевания возможно применение повторных курсов лечения.

Условия хранения:

В защищенном от света месте, при температуре от 4° до 10°С. Хранить в недоступном для детей месте. Не

применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Helepin-D