

[Хелепина Д Раствор 0.2%](#)



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Противовирусное средство; обладает активностью в отношении вирусов герпеса, стимулирует индукцию интерферона гамма и оказывает иммуностимулирующее действие в отношении клеточного и гуморального иммунитета.

Показания к применению:

- простой герпес генитальной и экстрагенитальной локализации (острые и рецидивирующие формы);
- экзема Капоши;
- опоясывающий лишай;
- герпетический стоматит;
- заболевания верхних дыхательных путей вирусной этиологии;
- ветряная оспа;
- герпетическая инфекция при вторичных иммунодефицитных состояниях;
- красный плоский лишай (эрозивно-язвенная и буллезная формы);
- герпетический древовидный кератит (в т.ч. поверхностный);
- офтальмогерпес (глубокие формы);
- аденовирусная инфекция глаз;
- последствия герпетической инфекции (эрозии, помутнения монетовидные);
- конъюнктивит герпетический.

Относится к болезням:

- [Ветряная оспа](#)
- [Ветрянка](#)
- [Герпес](#)
- [Инфекции](#)
- [Кератит](#)
- [Лишай](#)
- [Опоясывающий лишай](#)
- [Стоматит](#)
- [Экзема](#)

Противопоказания:

Гиперчувствительность.

Способ применения и дозы:

Для приема внутрь препарат назначают **взрослым и детям школьного возраста** - по 100-200 мг после еды 3-4 раза/сут; **детям младшего возраста** - 0.1 г 2-3 раза/сут; **детям до 1 года** - из расчета 10 мг/кг в 2 приема.

Наружно, препарат наносят на пораженные участки без повязки 2-6 раз/сут (5% мазь - на кожу и 1% мазь - на слизистые оболочки). Терапевтическое действие наиболее выражено при его использовании в начальном периоде заболевания или рецидиве. Курс лечения - от 5 дней до 4 недель.

При *распространенных высыпаниях, экземе Капоши* и при наличии общих явлений (лихорадка, лимфоаденопатия) проводят комбинированную терапию - внутрь, по 100-200 мг 3-4 раза/сут и наружно, в виде мази 5% (взрослым) и 1% (детям); курс лечения - от 7-10 дней до 3-4 нед.

При *опоясывающем лишае* - внутрь, по 100-200 мг 3-4 раза/сут и кожные аппликации 5% мази (взрослым) и 1% мази (детям) на очаги поражения. Минимальный курс лечения - 5-10 дней.

При *ветряной оспе* с лечебной и лечебно-профилактической целью - внутрь, по 100-200 мг 3-4 раза/сут (в зависимости от возраста и тяжести заболевания) в течение первых 5-7 сут и одновременно смазывают очаги поражения 1% мазью 3-6 раз/сут.

При *вторичных иммунодефицитных состояниях* - внутрь, по 100-200 мг 3-4 раза/сут и одновременно местно, в виде аппликаций 1% мази (дети) и 5% мази (взрослые); курс лечения - от 3-5 дней до 3-4 нед, в зависимости от тяжести и форм патологического процесса.

При *эрозивно-язвенной и буллезной форме красного плоского лишая, герпетическом стоматите* - внутрь, по 0.1 г 3 раза/сут и одновременно смазывают пораженные участки слизистой оболочки 1% мазью; курс лечения - от 5-7 дней до 2-4 нед, в зависимости от тяжести заболевания.

При *острых респираторных вирусных инфекциях* - внутрь, по 0.1 г 3-4 раза/сут в течение 5-7 дней. При *хроническом рецидивирующем течении* заболевания возможно применение повторных курсов лечения.

Местно, в виде инстилляций по 1-2 кап до 8 раз/сут.

При *герпетическом древовидном кератите* - в каждый глаз до 6-8 раз/сут в остром периоде заболевания. Одновременно применяют внутрь, по 100-200 мг 3-4 раза/сут. По мере выздоровления число инстилляций уменьшают до 2-3 раз/сут. Минимальный курс лечения - 7-8 дней.

При *поверхностном герпетическом древовидном кератите* в остром периоде заболевания - 6-8 раз/сут, по мере выздоровления - до 2-3 раз/сут. Курс лечения - 2 нед.

При *глубоких формах офтальмогерпеса* - 6-8 раз/сут в сочетании с приемом внутрь 100-200 мг. Курс лечения - 3 нед.

При *аденовирусной инфекции глаз* - 6 раз/сут в сочетании с приемом внутрь 100-200 мг 3 раза в сутки. Курс лечения - 2 нед.

При *эрозиях и монетовидных помутнениях* проводят комбинированную терапию с дексаметазоном 0.1%.

Побочное действие:

Аллергические реакции.

Особые указания и меры предосторожности:

Хелепина Д Раствор 0.2%

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Применение в детском возрасте

Применение возможно согласно режиму дозирования.

Источник: http://drugs.thead.ru/Helepina_D_Rastvor_02