

[Хепабос](#)



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Капсулы твердые, желатиновые, непрозрачные, №1. Корпус капсулы красного цвета, крышечка - коричневого цвета. Содержимое капсулы - пастообразная масса желтого цвета.

	1 капс.
"эссенциальные" фосфолипиды	300 мг
никотинамид	30 мг
пиридоксина гидрохлорид	6 мг
рибофлавин	6 мг
тиамина мононитрат	6 мг
α-токоферола ацетат	6 мг

Вспомогательные вещества: триглицериды среднецепочечные 45 мг.

10 шт. - блистеры Ал/ПВХ (3) - пачки картонные.
10 шт. - блистеры Ал/ПВХ (5) - пачки картонные.
10 шт. - блистеры Ал/ПВХ (10) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Эссенциальные фосфолипиды, входящие в состав препарата, являются основными структурными элементами наружных клеточных мембран и органелл гепатоцитов. В организме они оказывают нормализующее влияние на метаболизм липидов, белков и на дезинтоксикационную функцию печени; восстанавливают и сохраняют клеточную структуру печени, регулируют активность некоторых ферментативных систем, замедляют процесс формирования соединительной ткани в печени.

Витамины, входящие в состав препарата, выполняют функцию коферментов в различных биохимических процессах и потенцируют действие эссенциальных фосфолипидов.

Фармакокинетика

Эссенциальные фосфолипиды хорошо всасываются в желудочно-кишечном тракте, в т.ч. в виде биологически активных продуктов их гидролиза пищеварительными ферментами, которые транспортируются через стенку кишечника в лимфатическое русло. В печени происходит частичный ресинтез фосфатидилхолина из продуктов гидролиза. Эссенциальные фосфолипиды выводятся из организма главным образом при дефекации, небольшая часть с мочой. Витамины, входящие в состав препарата, выводятся почками. Альфа-токоферола ацетат выводится с желчью, частично почками. Период полувыведения препарата составляет около 20 часов.

Показания к применению:

- жировая дистрофия печени различной этиологии;
- нарушения липидного обмена печени;
- гепатит и цирроз печени;
- токсическое поражение печени (в т.ч. алкогольной, наркотической, лекарственной этиологии);
- лучевая болезнь;
- псориаз (в составе комплексной терапии).

Относится к болезням:

- [Гепатит](#)
- [Гепатоз](#)
- [Псориаз](#)
- [Цирроз печени](#)

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- холестаз;
- эмпиема желчного пузыря;
- детский возраст до 16 лет.

Способ применения и дозы:

Внутрь, по 2-3 капсулы 3 раза в день, во время еды, проглатывая целиком с достаточным количеством воды.

Курс лечения - не менее 3 месяцев, при необходимости возможно продление курса лечения.

Побочное действие:

Обычно препарат переносится хорошо. Очень редко наблюдаются аллергические реакции, газообразование, изжога, тошнота, диарея, окрашивание мочи в темно-желтый цвет (вследствие содержания витаминов группы В).

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата в период беременности возможно только по рекомендации врача, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

При необходимости приема препарата во время лактации рекомендуется решить вопрос о прекращении кормления грудью.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Леводопа - наблюдается снижение эффекта леводопы за счет содержащегося в препарате пиридоксина.

Колестирамин - снижается абсорбция никотинамида, содержащегося в препарате.

Рекомендуется соблюдать интервал в течение 4-6 часов между приемами этих двух препаратов.

Особые указания и меры предосторожности:

Хепабос

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Применение в детском возрасте

Противопоказано детям до 16 лет.

Условия хранения:

В сухом месте при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Hepabos>