Хилак форте



Код АТХ:

- A07FA

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Капли для приема внутрь*** в виде прозрачного, от светло-желтого до желто-коричневого раствора с характерным кисловатым запахом.

	100 мл
беззародышевый водный субстрат продуктов обмена веществ Escherichia coli DSM 4087	24.9481 г
беззародышевый водный субстрат продуктов обмена веществ Streptococcus faecalis DSM 4086	12.4741 г
беззародышевый водный субстрат продуктов обмена веществ Lactobacillus acidophilus DSM 4149	12.4741 г
беззародышевый водный субстрат продуктов обмена веществ Lactobacillus helveticus DSM 4183	49.896 г

Вспомогательные вещества: натрия фосфат гептагидрат, калия фосфат, молочная кислота, фосфорная кислота концентрированная, калия сорбат, лимонной кислоты моногидрат.

30 мл - флаконы темного стекла (1) с пробкой-капельницей и пластмассовой крышкой с контролем первого вскрытия - пачки картонные.
100 мл - флаконы темного стекла (1) с пробкой-капельницей и пластмассовой крышкой с контролем первого вскрытия - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Естественная физиологическая микрофлора кишечника может быть значительно нарушена путем таких внешних воздействий, как терапия антибиотиками, облучение, операции на желудке, а также вследствие неподходящего и непривычного питания, изменения воды, смены климата и других условий.

Хилак форте регулирует равновесие кишечной микрофлоры и нормализует ее состав. Благодаря содержанию в составе препарата продуктов обмена нормальной микрофлоры, Хилак форте способствует восстановлению нормальной микрофлоры кишечника биологическим путем и позволяет сохранить физиологические и биологические функции слизистой оболочки кишечника.

Входящая в состав препарата биосинтетическая молочная кислота и ее буферные соли восстанавливают нормальное значение кислотности в ЖКТ, независимо от того повышенная или пониженная кислотность у пациента.

На фоне ускорения развития нормальных симбионтов кишечника под действием препарата Хилак форте нормализуется естественный синтез витаминов группы В и К. Содержащиеся в препарате короткоцепочечные летучие жирные кислоты обеспечивают восстановление поврежденной микрофлоры кишечника при инфекционных заболеваниях ЖКТ, стимулируют регенерацию эпителиальных клеток кишечной стенки, восстанавливают нарушенный водно-электролитный баланс в просвете кишки.

Имеются данные о том, что Хилак форте усиливает защитные функции организма благодаря стимуляции иммунного ответа.

При применении Хилака форте отмечается ускорение выведения сальмонелл у грудных детей после сальмонеллезного энтерита, что обусловлено стимуляцией роста ацидофильной анаэробной флоры и ее последующим антагонистическим воздействием на сальмонеллы.

Показания к применению:

— нарушения физиологической флоры кишечника (во время и после лечения антибиотиками, сульфаниламидами, лучевой терапии);

— синдром недостаточности пищеварения, диспепсия;

— диарея, метеоризм, запоры;

— гастроэнтерит, колит;

— синдром старческого кишечника (хронические, атрофические гастроэнтериты);

— расстройства со стороны ЖКТ, вызванные сменой климата;

— гипо- и анацидные состояния;

— энтерогенные заболевания желчного пузыря и печени;

— аллергические кожные заболевания (крапивница, эндогенно обусловленная хроническая экзема);

— сальмонеллез в стадии реконвалесценции (в т.ч. у грудных детей).

Относится к болезням:

- Аллергия
- Гастрит
- Гастроэнтерит
- Диарея
- Диспепсия
- Запор
- Колит
- Крапивница
- Метеоризм
- Реконвалесценция
- Сальмонеллез
- Экзема
- Энтерит

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Взрослым препарат назначают по 40-60 капель 3 раза/сут; **детям** - по 20-40 капель 3 раза/сут; **младенцам -** по 15-30 капель 3 раза/сут. После улучшения состояния первоначальная суточная доза Хилак форте может быть уменьшена наполовину.

Препарат принимают внутрь до или во время приема пищи, разбавляя в небольшом количестве жидкости, исключая молоко.

Побочное действие:

Побочные реакции до настоящего времени не наблюдались.

Со стороны пищеварительной системы: возможны запор, диарея.

Аллергические реакции: возможны кожная сыпь, зуд, крапивница.

Хилак форте хорошо переносится пациентами любого возраста.

Передозировка:

Никаких специальных мероприятий, за исключением обычного медицинского наблюдения, не требуется.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата Хилак форте при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) считается безопасным. Решение о назначении препарата принимает врач.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении с антацидными препаратами возможна нейтрализация молочной кислоты, входящей в состав препарата Хилак форте.

Особые указания и меры предосторожности:

Не рекомендуется принимать препарат одновременно с молоком и молочными продуктами.

Применение в детском возрасте

Детям препарат назначают по 20-40 капель 3 раза/сут; **младенцам** - по 15-30 капель 3 раза/сут. После улучшения состояния первоначальная суточная доза Хилак форте может быть уменьшена наполовину.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С. Срок годности - 4 года, после вскрытия флакона - 6 недель.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Hilak_Forte