

[Химколин](#)



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

♦ **Крем для наружного применения** однородный, от желтовато-оранжевого до желтовато-коричневого цвета, со специфическим запахом.

	1 г
масло семян древогубца метельчатого	200 мг
масло печени сквалуса кархориуса	100 мг
масло феритимы постумы черв.	100 мг
масло листьев прутняка китайского	100 мг
масло семян фисташки настоящей	50 мг
масло семян хлопчатника индийского	50 мг
масло мутиллы западной насеk.	50 мг
масло скорлупы мускатника душистого	30 мг
масло плодов мускатника душистого	30 мг
масло цветочных почек гвоздичного дерева	30 мг
масло коры коричника ароматного	30 мг

обработанные над паром экстракта смеси растительного сырья: корней витании снотворной, корней четочника молитвенного, коры фикуса священного, корней анациклюса пиретринового, корней спаржи кистевидной.

Вспомогательные вещества: церезин воск, цетилстеариловый спирт, парафин желтый мягкий, воск пчелиный, метиловый эфир параоксибензойной кислоты, пропиловый эфир параоксибензойной кислоты, отдушка (роза), отдушка (мускусная).

10 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

30 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат растительного происхождения. Усиливает эрекцию за счет повышения кровенаполнения пещеристых тел полового члена, улучшает микроциркуляцию, стимулирует афферентные нервные окончания, повышает способность тканей к восприятию ощущений, способствует увеличению продолжительности полового акта.

Показания к применению:

Функциональные расстройства сексуальной сферы у мужчин (в т.ч. пожилого возраста):

—снижение полового влечения;
—нарушение эрекции;
—укорочение продолжительности полового акта.

Относится к болезням:

- [Нарушения эрекции](#)

Противопоказания:

—повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Крем наносят на половой член или лобковую область и втирают, слегка массируя, в течение 1-2 мин. Кратность применения 1-2 раза/сут. Курс лечения 30 дней.

Побочное действие:

Возможно: аллергические, а также кожные реакции на месте нанесения препарата.

Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата Химколин не сообщалось.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Комбинированное применение с препаратом Тентекс форте способствует усилению терапевтического эффекта.

Лекарственное взаимодействие препарата Химколин не описано.

Особые указания и меры предосторожности:

Крем не следует смывать сразу после нанесения на кожу.

Не рекомендуется наносить на мошонку, головку полового члена и слизистые оболочки. В случае нанесения крема перед половым актом излишки крема следует удалить салфеткой.

В случае развития кожных реакций после применения крема лечение следует прекратить.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом, недоступном для детей месте при температуре от 10° до 30°С.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Химколин

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Источник: <http://drugs.thead.ru/Himkolin>