Химотрипсин



Код АТХ:

- D03BA

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Химотрипсин

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакотерапевтическая группа:

- Метаболики

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Протеолитическое средство белковой природы, оказывает противовоспалительное действие, при местном применении расщепляет некротизированные ткани и фибринозные образования; разжижает вязкий секрет, экссудат, сгустки крови.

Показания к применению:

Тромбофлебит, пародонтоз (воспалительно-дистрофические формы), остеомиелит, гайморит, отит, ирит, иридоциклит, интракапсулярная экстракция катаракты, кровоизлияние в переднюю камеру глаза, отек периорбитальной области после операций и травм, трахеит, бронхит, эмпиема плевры, экссудативный плеврит, ожоги, гнойные раны, пролежни (применяют местно).

Относится к болезням:

- Бронхит
- Гайморит
- Иридоциклит
- Ирит
- Катаракта
- Кровоизлияния в переднюю камеру глаза
- Ожоги
- Остеомиелит
- Отит
- Плеврит
- Пролежни
- Раны
- Травмы
- Трахеит
- Эмпиема
- Эмпиема плевры

Противопоказания:

Гиперчувствительность, злокачественные новообразования, декомпенсированные формы туберкулеза легких, сердечная недостаточность II-III стадии, цирроз печени, инфекционный гепатит, панкреатит, геморрагический диатез, эмфизема легких, дыхательная недостаточность.

Способ применения и дозы:

Местно, на гнойные раневые поверхности накладывают на 8 ч стерильные салфетки, смоченные раствором 25-50 мг химотрипсина в 10-50 мл 0.25% раствора прокаина.

В/м, взрослым - по 2.5 мг 1 раз/сут; растворяют непосредственно перед применением 5 мг в 1-2 мл стерильного 0.9% раствора натрия хлорида или 0.5-2% раствора прокаина. Курс лечения - 6-15 инъекций.

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении с препаратами железа возможно уменьшение абсорбции железа.

Особые указания и меры предосторожности:

Нельзя вводить в кровоточащие полости, наносить на изъязвленные поверхности злокачественных опухолей.

При нарушениях функции печени

Противопоказан при циррозе печени, инфекционном гепатите, панкреатите.

Источник: http://drugs.thead.ru/Himotripsin