

[Химотрипсин](#)



Код АТХ:

- [D03BA](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Химотрипсин](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакотерапевтическая группа:

- [Метаболики](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Протеолитическое средство белковой природы, оказывает противовоспалительное действие, при местном применении расщепляет некротизированные ткани и фибриновые образования; разжижает вязкий секрет, экссудат, сгустки крови.

Показания к применению:

Тромбофлебит, пародонтоз (воспалительно-дистрофические формы), остеомиелит, гайморит, отит, ирит, иридоциклит, интракапсулярная экстракция катаракты, кровоизлияние в переднюю камеру глаза, отек периорбитальной области после операций и травм, трахеит, бронхит, эмпиема плевры, экссудативный плеврит, ожоги, гнойные раны, пролежни (применяют местно).

Относится к болезням:

- [Бронхит](#)
- [Гайморит](#)
- [Иридоциклит](#)
- [Ирит](#)
- [Катаракта](#)
- [Кровоизлияния в переднюю камеру глаза](#)
- [Ожоги](#)
- [Остеомиелит](#)
- [Отит](#)
- [Плеврит](#)
- [Пролежни](#)
- [Раны](#)
- [Травмы](#)
- [Трахеит](#)
- [Эмпиема](#)
- [Эмпиема плевры](#)

Противопоказания:

Гиперчувствительность, злокачественные новообразования, декомпенсированные формы туберкулеза легких, сердечная недостаточность II-III стадии, цирроз печени, инфекционный гепатит, панкреатит, геморрагический диатез, эмфизема легких, дыхательная недостаточность.

Способ применения и дозы:

Местно, на гнойные раневые поверхности накладывают на 8 ч стерильные салфетки, смоченные раствором 25-50 мг химотрипсина в 10-50 мл 0.25% раствора прокаина.

В/м, взрослым - по 2.5 мг 1 раз/сут; растворяют непосредственно перед применением 5 мг в 1-2 мл стерильного 0.9% раствора натрия хлорида или 0.5-2% раствора прокаина. Курс лечения - 6-15 инъекций.

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении с препаратами железа возможно уменьшение абсорбции железа.

Особые указания и меры предосторожности:

Нельзя вводить в кровоточащие полости, наносить на изъязвленные поверхности злокачественных опухолей.

При нарушениях функции печени

Противопоказан при циррозе печени, инфекционном гепатите, панкреатите.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Himotripsin>