Хлоргексидин-СФ



Код АТХ:

- D08AC02

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Хлоргексидин

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

◊ ***Раствор для местного и наружного применения*** в виде бесцвветной, прозрачной или слегка опалесцирующей жидкости.

	1 л
хлоргексидина биглюконат (в форме 20% раствора)	1 мл

Вспомогательные вещества: вода очищенная - до 1 л.

500 мл - бутылки (1) - пачки картонные.
500 мл - бутылки (16) - коробки картонные (для стационаров).
500 мл - контейнеры (18) - коробки картонные (для стационаров).
1000 мл - контейнеры (6) - коробки картонные (для стационаров).
2000 мл - контейнеры (4) - коробки картонные (для стационаров).

Фармакотерапевтическая группа:

- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Антисептическое средство. Хлоргексидин активен в отношении вегетативных форм грамотрицательных и грамположительных бактерий, а также дрожжей, дерматофитов и липофильных вирусов. На споры бактерий действует только при повышенной температуре. Очищает и дезинфицирует кожу, не вызывая ее повреждения.

Показания к применению:

Для местного применения: трихомонадный кольпит, эрозия шейки матки, зуд вульвы, профилактика венерических заболеваний (в т.ч. гонореи, сифилиса, трихомониаза, хламидиоза, уреаплазмоза); гингивит, стоматит, афты, парадонтит, альвеолит, дезинфекция съемных протезов; ангина; послеоперационный уход за больными в отделениях ЛОР и стоматологии.

Обработка ран, ожоговых ран и поверхностей; дезинфекция кожи пациента.

Обработка рук хирурга, медперсонала и операционного поля перед диагностическими манипуляциями, операцией.

Дезинфекция рабочих поверхностей приборов (в т.ч. термометров) и оборудования, термическая обработка которых нежелательна.

Относится к болезням:

- Альвеолит
- Ангина
- Вульвит
- Гингивит
- Гонорея
- Зуд
- Кольпит
- Сифилис
- Стоматит
- Трихомониаз
- Уреаплазма
- Эрозия шейки матки

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к хлоргексидину.

Способ применения и дозы:

Доза и способ применения зависят от показаний и лекарственной формы хлоргексидина.

Побочное действие:

Диагнозы

- Боли в горле
- Гайморит
- Заболевания уха
- Ларингит

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Хлоргексидин не совместим с мылом, а также с детергентами, содержащими анионную группу (сапонины, натрия лаурилсульфат, натрия карбоксиметилцеллюлоза).

Совместим с препаратами, содержащими катионную группу (цетримоний бромид, бензалконий хлорид).

Особые указания и меры предосторожности:

Сохраняет активность в присутствии примесей крови и органических веществ. Нельзя допускать попадания хлоргексидина в глаза (за исключением специальной лекарственной формы, предназначенной для промывания глаз), а также контакта с мозговыми оболочками и слуховым нервом.

Источник: http://drugs.thead.ru/Hlorgeksidin-SF