


[Хлоргексидин \(свечи\)](#)



Код АТХ:

- [D08AC02](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Хлоргексидин](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)

[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ Суппозитории вагинальные	1 супп.
хлоргексидина биглюконат	16 мг
5 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.	
◇ Суппозитории вагинальные	1 супп.
хлоргексидина биглюконат	8 мг
5 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.	

Фармакотерапевтическая группа:

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Хлоргексидин - антисептический препарат для местного (интравагинального) применения, активен в отношении простейших, грамположительных и грамотрицательных бактерий, вирусов, в т.ч. в отношении *Treponema pallidum*, *Chlamydia* spp., *Ureaplasma* spp., *Neisseria gonorrhoeae*, *Trichomonas vaginalis*, *Gardnerella vaginalis*, *Bacteroides fragilis*,

Хлоргексидин (свечи)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Herpes simplex 2 типа. К препарату слабочувствительны некоторые штаммы *Pseudomonas* spp., *Proteus* spp., а также устойчивы кислотоустойчивые формы бактерий, споры бактерий. Хлоргексидин не нарушает функциональную активность лактобактерий.

Фармакокинетика

Системная абсорбция при интравагинальном применении незначительная.

Показания к применению:

— профилактика инфекций, передаваемых половым путем (хламидиоз, уреаплазмоз, трихомоноз, гонорея, сифилис, генитальный герпес и другие);

— профилактика инфекционно-воспалительных осложнений в акушерстве и гинекологии (перед оперативным лечением гинекологических заболеваний, перед родами и абортom, до и после установки внутриматочной спирали (ВМС), до и после диатермокоагуляции шейки матки, перед внутриматочными исследованиями);

— лечение бактериального вагиноза, кольпитов (в т.ч. неспецифических, смешанных, трихомонадных).

Относится к болезням:

- [Вагинит](#)
- [Герпес](#)
- [Гонорея](#)
- [Диатез](#)
- [Инфекции](#)
- [Кольпит](#)
- [Кольпит](#)
- [Сифилис](#)
- [Трихомоноз](#)
- [Уреаплазма](#)

Противопоказания:

— детский возраст;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С осторожностью: беременность, период лактации.

Способ применения и дозы:

Интравагинально. Предварительно освободив суппозиторий от контурной ячейковой упаковки, его вводят во влагалище в положении лежа на спине.

Для лечения : по 1 суппозиторию 2 раза/сут в течение 7-10 дней. При необходимости возможно продление курса лечения до 20 дней.

Для профилактики инфекций, передаваемых половым путем: 1 суппозиторий не позднее 2 ч после полового акта.

Побочное действие:

Крайне редко (менее чем в 0.1% случаев) возможны аллергические реакции, зуд кожи, проходящие после отмены препарата.

Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата при беременности и в период лактации возможно, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не рекомендуется одновременное применение с йодосодержащими лекарственными средствами, если они применяются интравагинально.

Хлоргексидин не совместим с детергентами, содержащими анионную группу (сапонины, натрия лаурилсульфат, натрия карбоксиметилцеллюлоза) и мылами, если они вводятся интравагинально. Туалет наружных половых органов не влияет на эффективность и переносимость вагинальных суппозиториях Хлоргексидин, т.к. препарат применяется интравагинально.

Особые указания и меры предосторожности:

Хлоргексидин сохраняет активность (хотя и несколько пониженную) в присутствии крови, гноя.

Применение в детском возрасте

Противопоказан в детском возрасте.

Условия хранения:

Препарат хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности препарата - 2 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Hlorgeksidin_svechi