

## [Хлорхинальдин](#)



### **Код АТХ:**

- [G01AC03](#)

### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Хлорхинальдол](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Фармакотерапевтическая группа:**

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Антибактериальное, противопротозойное и противогрибковое средство для местного применения. Оказывает бактерицидное действие в отношении ряда грамотрицательных и грамположительных бактерий, а также амёб, трихомонад, лямблий, грибов.

### **Показания к применению:**

В ЛОР-практике: воспалительные заболевания полости рта и гортани (в составе комбинированных препаратов).

В гинекологии: инфекционно-воспалительные заболевания влагалища, вызванные чувствительными к хлорхинальдолу микроорганизмами.

### **Относится к болезням:**

- [Инфекции](#)

### **Противопоказания:**

Печеночная и/или почечная недостаточность, поражения зрительного и периферических нервов, повышенная чувствительность к хлорхинальдолу.

## **Способ применения и дозы:**

Индивидуальный, в зависимости от показаний и применяемой лекарственной формы.

## **Побочное действие:**

*Возможно:* аллергические реакции.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Не применять интравагинально во время менструации.

Рекомендуется избегать половых контактов непосредственно после интравагинального введения.

### ***При нарушениях функции почек***

Противопоказан при почечной недостаточности.

### ***При нарушениях функции печени***

Противопоказан при печеночной недостаточности.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Hlorhinaldin>