Холагол



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Капли для приема внутрь*** в виде прозрачной, красно-желтого цвета, слабо флюоресцирующей жидкости с ароматным запахом.

	10 мл
совокупность красителей корня куркумы	22.5 мг
франгуломодин	9 мг
масло мятное эфирное	3.6 г
масло эвкалиптовое эфирное	1.926 г
магния салицилат	180 мг

Вспомогательные вещества: этанол 95% (900 мг), ментол (9 мг), масло оливковое (до 10 мл).

10 мл - флаконы темного стекла с капельницей (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Оказывает желчегонное, спазмолитическое и послабляющее действие.

Показания к применению:

–— желчекаменная болезнь;

— хронический холецистит и холангит (в фазе ремиссии);

— диспептический синдром при хронических заболеваниях печени и после операции на желчевыводящих путях.

Относится к болезням:

- Холангит
- Холера
- Холецистит

Противопоказания:

–— повышенная чувствительность к компонентам препарата;

— острые воспалительные заболевания печени и желчевыводящих путей;

— тяжелые формы нарушения функции почек;

—– беременность;

— грудное вскармливание;

— детский возраст (до 12 лет).

С осторожностью: алкоголизм, эпилепсия, заболевания или травмы головного мозга.

Способ применения и дозы:

Внутрь по 5–10 капель на кусочке сахара за 30 мин до еды 3 раза в сут. Интервал между отдельными приемами должен быть не менее 5 ч. При необходимости (начинающаяся желчная колика) доза может быть увеличена до 20 капель на 1 прием.

Максимальная суточная доза 30 капель в день.

Для предотвращения появления или снижения диспептических явлений препарат можно принимать во время или после еды.

Курс лечения не должен превышать 6 недель.

Перед применением препарата у детей (старше 12 лет) следует проконсультироваться с врачом.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции, тошнота, рвота, изжога, понос.

Передозировка:

При передозировке или случайном приеме препарата ребенком могут появиться тошнота, судороги, боли в области живота, рвота, понос.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказано принимать данный препарат при беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не выявлены. О целесообразности одновременного приема Холагола с другими лекарственными средствами посоветуйтесь с врачом.

Особые указания и меры предосторожности:

Холагол содержит 9 % (m/v) этилового спирта.

В случаях, если Ваше самочувствие не улучшилось в течение 3-х дней или состояние ухудшилось, а также при появлении побочных реакций необходимо обратиться к врачу.

При применении в рекомендуемых дозах препарат не оказывает влияния на способность управлять транспортом и работать с механизмами.

При нарушениях функции почек

Противопоказано при тяжелых формах нарушения функции почек.

При нарушениях функции печени

Противопоказано при острых воспалительных заболеваниях печени.

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 12 лет. Перед применением препарата у детей (старше 12 лет) следует проконсультироваться с врачом.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в защищенном от света месте при температуре от 10°C до 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Не применять по истечении срока годности.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Holagol