

## [Холагол](#)



### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◊ **Капли для приема внутрь** в виде прозрачной, красно-желтого цвета, слабо флюоресцирующей жидкости с ароматным запахом.

	<b>10 мл</b>
совокупность красителей корня куркумы	22.5 мг
франгуломодин	9 мг
масло мятное эфирное	3.6 г
масло эвкалиптовое эфирное	1.926 г
магния салицилат	180 мг

*Вспомогательные вещества:* этанол 95% (900 мг), ментол (9 мг), масло оливковое (до 10 мл).

10 мл - флаконы темного стекла с капельницей (1) - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### **Фармакодинамика**

Оказывает желчегонное, спазмолитическое и послабляющее действие.

### Показания к применению:

- желчекаменная болезнь;
- хронический холецистит и холангит (в фазе ремиссии);
- диспептический синдром при хронических заболеваниях печени и после операции на желчевыводящих путях.

### Относится к болезням:

- [Холангит](#)
- [Холера](#)
- [Холецистит](#)

### Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- острые воспалительные заболевания печени и желчевыводящих путей;
- тяжелые формы нарушения функции почек;
- беременность;
- грудное вскармливание;
- детский возраст (до 12 лет).

*С осторожностью:* алкоголизм, эпилепсия, заболевания или травмы головного мозга.

## **Способ применения и дозы:**

Внутрь по 5–10 капель на кусочке сахара за 30 мин до еды 3 раза в сут. Интервал между отдельными приемами должен быть не менее 5 ч. При необходимости (начинающаяся желчная колика) доза может быть увеличена до 20 капель на 1 прием.

Максимальная суточная доза 30 капель в день.

Для предотвращения появления или снижения диспептических явлений препарат можно принимать во время или после еды.

Курс лечения не должен превышать 6 недель.

Перед применением препарата у детей (старше 12 лет) следует проконсультироваться с врачом.

## **Побочное действие:**

Возможны аллергические реакции, тошнота, рвота, изжога, понос.

## **Передозировка:**

При передозировке или случайном приеме препарата ребенком могут появиться тошнота, судороги, боли в области живота, рвота, понос.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Противопоказано принимать данный препарат при беременности и в период лактации.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Не выявлены. О целесообразности одновременного приема Холагола с другими лекарственными средствами посоветуйтесь с врачом.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Холагол содержит 9 % (m/v) этилового спирта.

В случаях, если Ваше самочувствие не улучшилось в течение 3-х дней или состояние ухудшилось, а также при появлении побочных реакций необходимо обратиться к врачу.

При применении в рекомендуемых дозах препарат не оказывает влияния на способность управлять транспортом и работать с механизмами.

### ***При нарушениях функции почек***

Противопоказано при тяжелых формах нарушения функции почек.

## **Холагол**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

### ***При нарушениях функции печени***

Противопоказано при острых воспалительных заболеваниях печени.

### ***Применение в детском возрасте***

Противопоказан детям до 12 лет. Перед применением препарата у детей (старше 12 лет) следует проконсультироваться с врачом.

### **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в защищенном от света месте при температуре от 10°C до 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Не применять по истечении срока годности.

### **Срок годности:**

3 года.

### **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Holagol>