

## Холебил



### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)

[Госреестр](#) [Википедия](#)

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

**Капсулы** твердые желатиновые №0, верхняя часть (крышечка) и нижняя (корпус) - матовые, коричневого цвета. Содержимое капсулы - порошок от желтовато-коричневого до коричневого цвета с характерным запахом.

	<b>1 капс.</b>
экстракт листьев артишока	400 мг

*Вспомогательные вещества:* тальк, магния стеарат, кремния диоксид коллоидный, крахмал кукурузный, лактозы моногидрат.

*Состав оболочки капсулы:* желатин, вода очищенная, лаурилсульфат натрия, титана диоксид E171, оксид железа красный E172, оксид железа черный E172, оксид железа желтый E172.

10 шт. - блистеры из ПВХ/ПВДХ/алюминиевой фольги (2) - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Оказывает желчегонное и гепатопротекторное действие, обусловленное содержанием комплекса биологически активных веществ экстракта из листьев артишока - фенольное соединение цинарин в сочетании с фенолокислотами (хлорогеновая и др.). Препарат стимулирует образование и отток желчи, перистальтику кишечника, способствует улучшению процессов пищеварения и уменьшению содержания холестерина в крови.

### Показания к применению:

- в комплексной терапии диспепсического синдрома при хроническом неэрозивном гастрите, дуодените;
- стеатозе;
- хроническом гепатите различной этиологии легкого течения;
- хроническом некалькулезном холецистите, дискинезии желчных путей;
- постхолецистэктомическом синдроме;
- хроническом панкреатите;
- хроническом колите.

**Относится к болезням:**

- [Гастрит](#)
- [Гепатит](#)
- [Гепатоз](#)
- [Диспепсия](#)
- [Дуоденит](#)
- [Колит](#)
- [Панкреатит](#)
- [Холера](#)
- [Холецистит](#)

**Противопоказания:**

- повышенная чувствительность к препарату;
- желчнокаменная болезнь;
- непроходимость желчных путей;
- тяжелые формы печеночной недостаточности;
- острые заболевания печени, почек, желче- и мочевыводящих путей;
- беременность, период лактации;
- детский возраст до 18 лет.

**Способ применения и дозы:**

Внутрь. Назначают по 1 капсуле 1-2 раза/сут во время еды, запивая достаточным количеством жидкости. Курс лечения - 3-4 недели.

**Побочное действие:**

Возможны аллергические реакции, боли в эпигастральной области, диарея, тошнота, изжога.

**Передозировка:**

При передозировке возможно усиление проявления побочных эффектов препарата. Лечение симптоматическое.

**Применение при беременности и кормлении грудью:**

Противопоказан при беременности, в период лактации.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

При одновременном приеме возможно ослабление действия антикоагулянтов кумаринового ряда (фенпрокумон, варфарин), что требует корректировки доз и консультации с лечащим врачом.

**Особые указания и меры предосторожности:**

Если на фоне приема препарата в течение 7 дней не наблюдается улучшения состояния - следует обратиться к врачу.

В связи с наличием в составе лактозы, не рекомендуется принимать пациентам с непереносимостью лактозы, дефицитом лактазы или глюкозо-галактозной мальабсорбцией.

## **Холебил**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

### *Влияние на способность управлять автомобилем или другими механическими средствами*

Препарат не влияет на психофизическое состояние, не вызывает сонливости и не влияет на способность управлять автомобилем или другими механическими средствами.

### **При нарушениях функции почек**

Противопоказан при острых заболеваниях почек.

### **При нарушениях функции печени**

Противопоказан при тяжелых формах печеночной недостаточности; острых заболеваниях печени.

### **Применение в детском возрасте**

Противопоказан в детском и подростковом возрасте до 18 лет.

## **Условия хранения:**

Препарат хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

Срок годности - 2 года 6 месяцев. Не применять по истечении срока годности.

## **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Holebil>