Холебил



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Капсулы твердые желатиновые №0, верхняя часть (крышечка) и нижняя (корпус) - матовые, коричневого цвета. Содержимое капсулы - порошок от желтовато-коричневого до коричневого цвета с характерным запахом.

	1 капс.
экстракт листьев артишока	400 мг

Вспомогательные вещества: тальк, магния стеарат, кремния диоксид коллоидный, крахмал кукурузный, лактозы моногидрат.

Состав оболочки капсулы: желатин, вода очищенная, лаурилсульфат натрия, титана диоксид Е171, оксид железа красный Е172, оксид железа черный Е172, оксид железа желтый Е172.

10 шт. - блистеры из ПВХ/ПВДХ/алюминиевой фольги (2) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Оказывает желчегонное и гепатопротекторное действие, обусловленное содержанием комплекса биологически активных веществ экстракта из листьев артишока - фенольное соединение цинарин в сочетании с фенолокислотами (хлорогеновая и др.). Препарат стимулирует образование и отток желчи, перистальтику кишечника, способствует улучшению процессов пищеварения и уменьшению содержания холестерина в крови.

Показания к применению:

— в комплексной терапии диспепсического синдрома при хроническом неэрозивном гастрите, дуодените;

— стеатозе;

— хроническом гепатите различной этиологии легкого течения;

— хроническом некалькулезном холецистите, дискинезии желчных путей;

— постхолецистэктомическом синдроме;

— хроническом панкреатите;

— хроническом колите.

Относится к болезням:

- Гастрит
- Гепатит
- Гепатоз
- Диспепсия
- Дуоденит
- Колит
- Панкреатит
- Холера
- Холецистит

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к препарату;

— желчнокаменная болезнь;

— непроходимость желчных путей;

— тяжелые формы печеночной недостаточности;

— острые заболевания печени, почек, желче- и мочевыводящих путей;

— беременность, период лактации;

— детский возраст до 18 лет.

Способ применения и дозы:

Внутрь. Назначают по 1 капсуле 1-2 раза/сут во время еды, запивая достаточным количеством жидкости. Курс лечения - 3-4 недели.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции, боли в эпигастральной области, диарея, тошнота, изжога.

Передозировка:

При передозировке возможно усиление проявления побочных эффектов препарата. Лечение симптоматическое.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан при беременности, в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном приеме возможно ослабление действия антикоагулянтов кумаринового ряда (фенпрокумон, варфарин), что требует корректировки доз и консультации с лечащим врачом.

Особые указания и меры предосторожности:

Если на фоне приема препарата в течение 7 дней не наблюдается улучшения состояния - следует обратиться к врачу.

В связи с наличием в составе лактозы, не рекомендуется принимать пациентам с непереносимостью лактозы, дефицитом лактазы или глюкозо-галактозной мальабсорбцией.

Влияние на способность управлять автомобилем или другими механическими средствами

Препарат не влияет на психофизическое состояние, не вызывает сонливости и не влияет на способность управлять автомобилем или другими механическими средствами.

При нарушениях функции почек

Противопоказан при острых заболеваниях почек.

При нарушениях функции печени

Противопоказан при тяжелых формах печеночной недостаточности; острых заболеваниях печени.

Применение в детском возрасте

Противопоказан в детском и подростковом возрасте до 18 лет.

Условия хранения:

Препарат хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С.

Срок годности - 2 года 6 месяцев. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Holebil