Холензим



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Желчь
- Порошок из pancreas и слизистой тонкой кишки

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[мнн] [мнн] Википедия[мнн] [мнн] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат, оказывает желчегонное действие.

Пищеварительные ферменты (трипсин, амилаза, липаза) и желчь облегчают переваривание белков, жиров, углеводов, что способствует их более полному всасыванию в тонком кишечнике.

Препарат улучшает функциональное состояние ЖКТ, нормализует процесс пищеварения.

Показания к применению:

В качестве желчегонного и пищеварительного ферментного средства при заболеваниях и функциональных расстройствах ЖКТ:

— хронический гепатит;

— хронический холецистит;

— хронический панкреатит;

— гастрит;

— колит;

— метеоризм;

— диарея неинфекционного генеза.

Для улучшения переваривания пищи у лиц с нормальной функцией ЖКТ в случае погрешностей в питании (употребление жирной пищи, большого количества пищи, нерегулярное питание) и при нарушениях жевательной функции, малоподвижном образе жизни, длительной иммобилизации.

Относится к болезням:

- Гастрит
- Гепатит
- Гепатоз
- Диарея
- Колит
- Панкреатит
- Холера
- Холецистит

Противопоказания:

— гиперчувствительность;

— острый панкреатит;

— обострение хронического панкреатита;

— обтурационная желтуха.

Способ применения и дозы:

Препарат принимают внутрь после еды, по 1 таб. 1-3 раза/сут.

Побочное действие:

Аллергические реакции (чиханье, слезотечение, гиперемия кожи, кожная сыпь).

Источник: http://drugs.thead.ru/Holenzim