

Холензим



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Желчь](#)
- [Порошок из pancreas и слизистой тонкой кишки](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [МНН](#) [Википедия](#)^{МНН} [МНН](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат, оказывает желчегонное действие.

Пищеварительные ферменты (трипсин, амилаза, липаза) и желчь облегчают переваривание белков, жиров, углеводов, что способствует их более полному всасыванию в тонком кишечнике.

Препарат улучшает функциональное состояние ЖКТ, нормализует процесс пищеварения.

Показания к применению:

В качестве желчегонного и пищеварительного ферментного средства при заболеваниях и функциональных расстройствах ЖКТ:

- хронический гепатит;
- хронический холецистит;
- хронический панкреатит;
- гастрит;
- колит;
- метеоризм;
- диарея неинфекционного генеза.

Для улучшения переваривания пищи у лиц с нормальной функцией ЖКТ в случае погрешностей в питании (употребление жирной пищи, большого количества пищи, нерегулярное питание) и при нарушениях жевательной функции, малоподвижном образе жизни, длительной иммобилизации.

Относится к болезням:

- [Гастрит](#)
- [Гепатит](#)
- [Гепатоз](#)
- [Диарея](#)
- [Колит](#)
- [Панкреатит](#)
- [Холера](#)
- [Холецистит](#)

Противопоказания:

- гиперчувствительность;
- острый панкреатит;
- обострение хронического панкреатита;
- обтурационная желтуха.

Способ применения и дозы:

Препарат принимают внутрь после еды, по 1 таб. 1-3 раза/сут.

Побочное действие:

Аллергические реакции (чиханье, слезотечение, гиперемия кожи, кожная сыпь).

Источник: <http://drugs.thead.ru/Holenzim>