

## Холи-Альфа



### Код АТХ:

- [N07AX02](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Холина альфосцерат](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

#### Форма выпуска, описание и состав

**Раствор для инфузий и в/м введения** прозрачный, бесцветный или с желтоватым оттенком.

	<b>1 мл</b>
холина альфосцерат	250 мг

Вспомогательные вещества: вода д/и - до 1 мл.

4 мл - ампулы (5) - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.

4 мл - ампулы (5) - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Нейротропные средства](#)

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Холиномиметик. Является предшественником ацетилхолина. Оказывает влияние преимущественно на холинергические рецепторы в ЦНС. Глицерофосфат, который образуется при расщеплении холина альфосцерата, является предшественником фосфолипидов (фосфатидилхолина) мембраны нейрона. Облегчает передачу нервных импульсов в холинергических нейронах, улучшает пластичность нейрональных мембран и функцию рецепторов.

### Показания к применению:

Острый период черепно-мозговой травмы с преимущественно стволовым уровнем поражения, хроническая цереброваскулярная недостаточность (дисциркуляторная энцефалопатия); синдром деменции различного генеза, в

т.ч. болезнь Альцгеймера; ишемический инсульт (ранний и поздний восстановительный период); хорей Геттингтона; старческая псевдомеланхолия.

**Относится к болезням:**

- [Болезнь Альцгеймера](#)
- [Деменция](#)
- [Дисциркуляторная энцефалопатия](#)
- [Инсульт](#)
- [Ишемический инсульт](#)
- [Травмы](#)
- [Хорея](#)
- [Цереброваскулярная недостаточность](#)
- [Черепно-мозговая травма](#)
- [Энцефалит](#)

**Противопоказания:**

Беременность, лактация, повышенная чувствительность к холина альфосцерату.

**Способ применения и дозы:**

Внутрь: по 400 мг 3 раза/сут, курс лечения 3-6 мес. В/м или в/в: 1 г/сут.

**Побочное действие:**

Диагнозы

- Бессонница
- Болезнь Альцгеймера
- Болезнь Паркинсона (паркинсонизм)
- Боли в спине

**Применение при беременности и кормлении грудью:**

Противопоказан при беременности, в период лактации.

**Особые указания и меры предосторожности:**

При возникновении тошноты дозу следует уменьшить.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Holi-Alfa>