

## [Холисал](#)



### Код АТХ:

- [A01AD11](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Холина салицилат](#)
- [Цеталкония хлорид](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Гель стоматологический** в виде бесцветной, прозрачной, однородной массы с запахом анисового масла.

	<b>1 г</b>
холина салицилат	87.1 мг
Цеталкония хлорид	100 мкг

*Вспомогательные вещества:* гиэтеллоза - 20 мг, метилпарагидроксибензоат - 1.5 мг, пропилпарагидроксибензоат - 0.8 мг, глицерол - 50 мг, аниса обыкновенного семян масло - 1.61 мг, этанол 96% - 390 мг, вода - до 1000 мг.

10 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Ненаркотические анальгетики, включая нестероидные и другие противовоспалительные средства](#)
- [Органотропные средства](#)

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Комбинированный препарат для местного применения в стоматологии с противомикробным, противовоспалительным и анальгезирующим действием.

При местном применении *холина салицилат* быстро всасывается слизистой оболочкой полости рта, оказывая местное обезболивающее, противовоспалительное и жаропонижающее действие. Тормозит активность ЦОГ, функции макрофагов и нейтрофилов, продукцию интерлейкина-1 и угнетает синтез простагландинов. Обладает также противомикробным и противогрибковым действием в кислой и щелочной среде.

*Цеталкония хлорид* - антисептик, действует на бактерии, грибы и вирусы.

Гелевая этанолсодержащая адгезивная основа обеспечивает быстрое развитие эффекта и длительно удерживает на слизистой оболочке действующие вещества.

Анальгезирующее действие наступает через 2-3 мин, при этом его продолжительность составляет 2-8 ч.

### **Фармакокинетика**

При нанесении на слизистые оболочки хорошо всасывается.

## **Показания к применению:**

Для местного применения на слизистых оболочках полости рта в качестве обезболивающего и противовоспалительного средства при лечении заболеваний пародонта, повреждений слизистой оболочки, заболеваний, протекающих с воспалительной реакцией и болью:

- стоматит различной этиологии;
- гингивит;
- пародонтит;
- повреждение слизистой оболочки полости рта при ношении зубных протезов;
- травмы слизистой оболочки полости рта;
- боль при прорезывании зубов у детей;
- хейлит;
- кандидоз слизистой оболочки полости рта;
- небольшие оперативные вмешательства в полости рта;
- красный плоский лишай при локализации на слизистой оболочке полости рта;
- поражение слизистой оболочки полости рта при синдроме Стивенса-Джонсона (в составе комплексной терапии).

## **Относится к болезням:**

- [Гингивит](#)
- [Лишай](#)
- [Пародонтит](#)
- [Травмы](#)

## **Противопоказания:**

- повышенная чувствительность к салицилатам и другим компонентам препарата.

С *осторожностью* следует применять препарат при беременности, в период грудного вскармливания и у детей в возрасте до 1 года.

## **Способ применения и дозы:**

Холисал применяют местно 2-3 раза/сут до еды (с целью обезболивания) или после еды и перед сном. Полоску геля длиной 1 см для **взрослых** и 0.5 см для **детей** выдавливают на чистый палец и втирают легкими массирующими

движениями в пораженный участок слизистой оболочки полости рта.

При *заболеваниях пародонта* гель следует закладывать в десневые карманы или применять в виде компрессов, или осторожно втирать в десны 1-2 раза/сут.

### **Побочное действие:**

*Местные реакции:* кратковременное ощущение жжения в месте нанесения препарата, проходящее самостоятельно.

*Прочие:* аллергические реакции.

### **Передозировка:**

Случаи передозировки не выявлены.

### **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Следует с осторожностью применять Холисал при беременности и в период грудного вскармливания.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

При применении Холисала в дозах, значительно превышающих рекомендуемые, возможно усиление действия других одновременно применяемых противовоспалительных, жаропонижающих и болеутоляющих средств.

### **Особые указания и меры предосторожности:**

При появлении первых признаков побочного действия пациенту следует сразу обратиться к лечащему врачу.

Препарат следует применять только для местного применения.

Препарат не содержит сахар.

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

Препарат не ограничивает психофизическую активность, способность к управлению транспортными средствами и обслуживанию движущихся механизмов.

#### ***Применение в детском возрасте***

С *осторожностью* следует применять препарат у детей младше 1 года.

### **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C; не замораживать.

### **Срок годности:**

3 года.

### **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Holisal>