

Холитилин



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Холина альфосцерат](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Холиномиметик. Является предшественником ацетилхолина. Оказывает влияние преимущественно на холинергические рецепторы в ЦНС. Глицерофосфат, который образуется при расщеплении холина альфосцерата, является предшественником фосфолипидов (фосфатидилхолина) мембраны нейрона. Облегчает передачу нервных импульсов в холинергических нейронах, улучшает пластичность нейрональных мембран и функцию рецепторов.

Показания к применению:

Острый период черепно-мозговой травмы с преимущественно стволовым уровнем поражения, хроническая цереброваскулярная недостаточность (дисциркуляторная энцефалопатия); синдром деменции различного генеза, в т.ч. болезнь Альцгеймера; ишемический инсульт (ранний и поздний восстановительный период); хорея Геттингтона; старческая псевдомеланхолия.

Относится к болезням:

- [Деменция](#)
- [Дисциркуляторная энцефалопатия](#)
- [Инсульт](#)
- [Ишемический инсульт](#)
- [Травмы](#)
- [Хорея](#)
- [Цереброваскулярная недостаточность](#)
- [Черепно-мозговая травма](#)
- [Энцефалит](#)

Противопоказания:

Беременность, лактация, повышенная чувствительность к холина альфосцерату.

Способ применения и дозы:

Внутрь: по 400 мг 3 раза/сут, курс лечения 3-6 мес. В/м или в/в: 1 г/сут.

Побочное действие:

Возможна тошнота.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан при беременности, в период лактации.

Особые указания и меры предосторожности:

При возникновении тошноты дозу следует уменьшить.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Holitilin>