Хондрофен



Код АТХ:

- M01AB55

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакотерапевтическая группа:

- Метаболики

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат.

Хондроитина сульфат ускоряет синтез протеогликанов, замедляет резорбцию костной ткани, снижает потерю кальция, нормализует обмен в гиалиновой ткани. Ускоряет процессы восстановления костной ткани, тормозит процесс дегенерации хрящевой ткани, стимулирует регенерацию суставного хряща и пораженных межпозвоночных дисков. Обладает анальгезирующим и противовоспалительным действием.

Диклофенак - НПВС, угнетает ЦОГ-1 и ЦОГ-2, нарушает метаболизм арахидоновой кислоты и синтез простагландинов, являющихся основным звеном в развитии воспаления. Обладает выраженными анальгезирующими и противовоспалительными свойствами.

Диметилсульфоксид проникает через биологические мембраны (в т.ч. через кожу), обладает умеренным антисептическим, анальгезирующим и противовоспалительным действием.

Фармакокинетика

Хорошо проникает через кожу, накапливается в подлежащих тканях.

Показания к применению:

— посттравматическое воспаление мягких тканей и суставов;

— болевой синдром и отечность, связанные с заболеванием мышц и суставов (в т.ч. ревматоидный артрит, остеоартроз, остеохондроз, радикулит, люмбаго, ишиас, дегенеративные заболевания суставов и позвоночника).

Относится к болезням:

- Артрит
- Артроз
- Болевой синдром
- Воспаление
- Ишиас
- Люмбаго
- Остеоартрит
- Остеоартроз
- Остеохондроз
- Радикулит
- Ревматоидный артрит

Противопоказания:

— гиперчувствительность (в т.ч. к ацетилсалициловой кислоте и другим НПВС);

— бронхиальная астма в сочетании с полипозом слизистой оболочки носа;

— нарушение целостности кожных покровов в месте предполагаемого нанесения;

— беременность (III триместр);

— период лактации;

— детский возраст (до 12 лет).

С *осторожностью:* печеночная порфирия (обострение), эрозивно-язвенные поражения ЖКТ, тяжелые печеночная недостаточность, ХПН, ХСН, бронхиальная астма, пожилой возраст, беременность (I и II триместр).

Способ применения и дозы:

Наружно, наносят на кожу 3-4 г (5-6 см полоски, выдавленной из тюбика) 2-3 раза/сут, втирают до полного впитывания в течение 2-3 мин. Курс лечения 2-3 нед. При необходимости курс лечения повторяют.

Побочное действие:

Аллергические реакции: крапивница, ангионевротический отек, бронхоспазм.

Местные реакции: экзема, контактный дерматит (зуд, покраснение, отечность, папулезная и везикулярная сыпь, шелушение).

Прочие: генерализованная кожная сыпь, фотосенсибилизация.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказания: беременность (III триместр); период лактации.

С *осторожностью:* беременность (I и II триместр).

Особые указания и меры предосторожности:

Мазь необходимо наносить на неповрежденную кожу; не следует накладывать окклюзионную повязку. Не допускать попадания в глаза и на слизистые оболочки.

При нарушениях функции почек

С *осторожностью:* ХПН.

При нарушениях функции печени

С *осторожностью:* печеночная порфирия (обострение), тяжелые печеночная недостаточность.

Применение в пожилом возрасте

С *осторожностью:* пожилой возраст.

Применение в детском возрасте

Противопоказание — детский возраст (до 12 лет).

Источник: http://drugs.thead.ru/Hondrofen