


## [Хондроитин](#)



### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Хондроитина сульфат](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Средство, влияющее на фосфорно-кальциевый обмен в хрящевой ткани, является высокомолекулярным мукополисахаридом. Замедляет резорбцию костной ткани и снижает потери кальция, ускоряет процессы восстановления костной ткани, тормозит процесс дегенерации хрящевой ткани. Препятствует сжатию соединительной ткани и играет роль своеобразной смазки суставных поверхностей. При наружном применении замедляет прогрессирование остеоартроза. Нормализует обмен веществ в гиалиновой ткани. Стимулирует регенерацию суставного хряща.

#### **Фармакокинетика**

При однократном приеме внутрь среднетерапевтической дозы  $C_{max}$  в плазме достигается через 3-4 ч, в синовиальной жидкости - через 4-5 ч. Биодоступность составляет 13%. Выводится почками в течение 24 ч.

### **Показания к применению:**

Остеопороз, парадонтопатия, переломы (для ускорения образования костной мозоли), дегенеративно-дистрофические заболевания суставов и позвоночника.

### **Противопоказания:**

Повышенная чувствительность к хондроитину сульфату, склонность к кровотечениям, тромбофлебиты, беременность, период лактации (грудное вскармливание).

## **Способ применения и дозы:**

Внутрь взрослым - по 1.5-1 г 2 раза/сут.

Наружно - 2 раза/сут в течение 2-3 недель.

## **Побочное действие:**

*Редко:* аллергические реакции.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Хондроитин сульфат противопоказан к применению при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

## **Особые указания и меры предосторожности:**

При различных формах парадонтопатии курс лечения следует продолжать не менее 3 месяцев.

Имеются клинические данные о применении хондроитин сульфата у пожилых пациентов с атеросклерозом, при этом отмечено некоторое снижение концентрации холестерина и триглицеридов в плазме крови.

### ***Применение в пожилом возрасте***

Имеются клинические данные о применении хондроитин сульфата у пожилых пациентов с атеросклерозом, при этом отмечено некоторое снижение концентрации холестерина и триглицеридов в плазме крови.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Hondroitin>