Хондроксид Максимум



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Глюкозамин

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Крем для наружного применения 8%*** от светло-желтого до желтого цвета, со слабым запахом ментола.

	1 г
глюкозамина сульфата калия хлорид	80 мг

Вспомогательные вещества: диметилсульфоксид, макрогол (полиэтиленгликоль), цетиловый спирт, масло мяты перечной, аскорбиновая кислота, бутилгидрокситолуол, метилпарагидроксибензоат, метилизотиазолинон, вода дистиллированная, триглицериды натуральные, краситель куркумин.

50 г - тубы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.
100 г - тубы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.
250 г - тубы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.
50 г - тубы полиэтиленовые (1) - пачки картонные (12) - коробки картонные.
100 г - тубы полиэтиленовые (1) - пачки картонные (12) - коробки картонные.
250 г - тубы полиэтиленовые (1) - пачки картонные (12) - коробки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Глюкозамина сульфат обладает хондропротекторными свойствами, снижает дефицит гликозаминогликанов в организме, является специфическим субстратом и стимулятором синтеза гиалуроновой кислоты и протеогликанов. Глюкозамина сульфат способствует восстановлению хрящевых поверхностей периферических суставов и суставов позвоночника. Обладает противовоспалительными и аналгезирующими свойствами. Уменьшает боль и потребность в приеме нестероидных противовоспалительных препаратов, угнетает образование супероксидных радикалов и

ферментов, повреждающих хрящевую ткань (коллагеназы и фосфолипазы).

Фармакокинетика

нет данных.

Показания к применению:

— остеоартроз периферических суставов и суставов позвоночника.

Относится к болезням:

- Остеоартрит
- Остеоартроз

Противопоказания:

— повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата;

— повреждение кожных покровов в месте нанесения препарата;

— детский возраст до 12 лет;

— беременность;

— период лактации.

Способ применения и дозы:

Крем наносят 2-3 раза в день на кожу над местом поражения полоской длиной 2-3 см и втирают до полного всасывания в кожу. Длительность использования препарата 3-4 недели. Возможно повторение курса.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

Передозировка:

Случаи передозировки и ошибочного использования препарата не описаны.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказано при беременности и лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не следует использовать крем одновременно с нанесением иных лекарственных препаратов для наружного применения. Риск развития аллергических реакций возрастает при непереносимости морепродуктов.

Особые указания и меры предосторожности:

Не наносить на поврежденные участки кожи. Клинические данные об эффективности и безопасности применения препарата у беременных и кормящих грудью женщин отсутствуют.

Применение в детском возрасте

Противопоказано детям до 12 лет.

Условия хранения:

В сухом месте при температуре не выше 25°С. Хранить в местах, недоступных для детей.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Hondroksid_Maksimum