Хондроксид (раствор)



Код АТХ:

• M01AX25

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

• Хондроитина сульфат

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель Госреестр $^{\rm MHH}$ Википедия $^{\rm MHH}$ РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com $^{\rm ahr}$

Форма выпуска:

Таблетки, 250 мг. В контурной ячейковой упаковке 10 шт. 3, 5, 6, 9 или 10 контурных ячейковых упаковок в пачке картонной.

Состав:

Таблетки	1 табл.
активное вещество:	
хондроитина сульфат натрия	250 мг
вспомогательные вещества: кальция стеарат; кросповидон; повидон К30; МКЦ; магния гидроксикарбонат (магния карбонат тяжелый)	

Фармакотерапевтическая группа:

• Метаболики

Фармакологические свойства:

Фармакологическое действие — противовоспалительное, регенерирующее, хондростимулирующее.

Фармакодинамика

Средство, влияющее на фосфорно-кальциевый обмен в хрящевой ткани, является высокомолекулярным

мукополисахаридом. Замедляет резорбцию костной ткани и снижает потери кальция, ускоряет процессы восстановления костной ткани, тормозит процесс дегенерации хрящевой ткани. Препятствует сжатию соединительной ткани и играет роль своеобразной смазки суставных поверхностей. При наружном применении замедляет прогрессирование остеоартроза. Нормализует обмен веществ в гиалиновой ткани. Стимулирует регенерацию суставного хряща.

Фармакокинетика

При однократном приеме внутрь среднетерапевтической дозы C_{max} в плазме достигается через 3-4 ч, в синовиальной жидкости - через 4-5 ч. Биодоступность составляет 13%. Выводится почками в течение 24 ч.

Показания к применению:

Остеопороз, парадонтопатия, переломы (для ускорения образования костной мозоли), дегенеративнодистрофические заболевания суставов и позвоночника.

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к хондроитина сульфату, склонность к кровоточивости, тромбофлебиты, беременность, период лактации (грудное вскармливание).

Способ применения и дозы:

Внутрь взрослым - по 1.5-1 г 2 раза/сут.

Наружно - 2 раза/сут в течение 2-3 недель.

Побочное действие:

Редко: аллергические реакции.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Хондроитина сульфат противопоказан к применению при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Особые указания и меры предосторожности:

Диагнозы

- Анкилозирующий спондилит
- Болезнь Педжета
- Гигантоклеточный артериит
- Остеомиелит

Источник: http://drugs.thead.ru/Hondroksid_rastvor