# Ибалгин



### Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель Госреестр Википедия РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com<sup>англ</sup>

# Форма выпуска:

 $\Diamond$  **Крем для наружного применения 5%** эмульсионного типа, белого или почти белого цвета.

	<u>1 r</u>	
ибупрофен	50 мг	

Вспомогательные вещества: витепсол (жир гидрированный), средние насыщенные триацетилглицериды (миглиол 812), цетилстеариловый спирт, этоксилированные спирты C12-C16 (словасол 2430), моноглицериды насыщенных высших жирных кислот (полинол A), карбомер 940, троламин, метилпарабен, пропилпарабен, пропиленгликоль, вода очищенная.

30 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

50 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Препарат оказывает местное обезболивающее, противовоспалительное действие, устраняет воспалительный отек. Ключевым звеном в механизме специфического действия ибупрофена является торможение синтеза простагландинов за счет ингибирования циклооксигеназ 1 и 2 типа.

#### Фармакокинетика

После нанесения крема на кожу ибупрофен хорошо проникает в подкожную клетчатку. С<sub>тах</sub> ибупрофена в плазме после местного нанесения 5 г крема (соответствует 250 мг ибупрофена) - около 100 нг/мл, что составляет около 0.5% от таковой, после приема аналогичной дозы внутрь.

## Показания к применению:

- заболевания опорно-двигательного аппарата: ревматоидный артрит, псориатический артрит, анкилозирующий спондилоартрит, остеоартроз периферических суставов и позвоночника, боль в нижней части спины;
- мышечные боли ревматического и неревматического происхождения;
- травматическое повреждение мягких тканей.

### Относится к болезням:

- Анкилозирующий спондилоартрит
- Артрит
- Артроз
- Остеоартрит
- Остеоартроз
- Псориаз
- Ревматизм
- Спондилоартрит
- Травмы

# Противопоказания:

- наличие в анамнезе приступов бронхиальной астмы и других аллергических проявлений, связанных с применением ацетилсалициловой кислоты или других НПВП;
- мокнущие дерматозы;
- экзема;
- инфицированные ссадины и раны;
- детский возраст до 12 лет;
- беременность, период лактации;
- гиперчувствительность к основному действующему веществу или к другим компонентам препарата.

Препарат нельзя наносить на открытую раневую поверхность, поврежденную поверхность кожных покровов. Следует избегать попадания крема в глаза, слизистые оболочки.

# Способ применения и дозы:

Наружно. Полоску крема Ибалгин длиной 4-10 см наносят на кожу пораженной области 2-3 раза/сут и втирают легкими движениями. При выраженном болевом синдроме и обширных гематомах на обработанную кремом поверхность кожи можно положить защитную воздухопроницаемую повязку. Длительность лечения не должна превышать 5-7 дней, без консультации с врачом.

# Побочное действие:

*Возможны* аллергические реакции к компонентам препарата в виде покраснения, зуда кожных покровов, отека, чувства жжения, кожной сыпи.

При длительном применении возможно развитие системных побочных эффектов, характерных для НПВП.

При появлении признаков аллергических реакций применение препарат следует прекратить.

### Передозировка:

Случаи передозировки не описаны.

При случайном приеме препарата внутрь или нанесении на поврежденные кожные покровы возможно появление тошноты и рвоты, необходимо промыть желудок и обратиться к врачу, при необходимости проводят симптоматическое лечение.

### Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказание: беременность, период лактации.

# Особые указания и меры предосторожности:

Не рекомендуется Ибалгин крем разбавлять или смешивать с другими средствами для наружного применения.

#### Применение в детском возрасте

Противопоказание: детский возраст до 12 лет.

# Условия хранения:

При температуре 10-25°C в сухом и недоступном для детей месте.

# Срок годности:

2 года.

# Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/lbalgin