

Иберогаст



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Настойка	100 мл
спиртовой экстракт свежесобранного горького ибериса	15 мл
спиртовой экстракт корней дягиля	10 мл
спиртовой экстракт лепестков ромашки	20 мл
спиртовой экстракт тмина	10 мл
спиртовой экстракт плодов расторопши	10 мл
спиртовой экстракт листьев мелиссы	10 мл
спиртовой экстракт листьев мяты перечной	5 мл
спиртовой экстракт чистотела	10 мл
спиртовой экстракт корней солодки	10 мл

Вспомогательные вещества: этанол 31 об.%.
20 мл - флаконы (1) - пачки картонные.
50 мл - флаконы (1) - пачки картонные.
100 мл - флаконы (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат обладает выраженным противовоспалительным действием, а также нормализует тонус гладкой мускулатуры ЖКТ: способствует устранению спазма без влияния на нормальную перистальтику, а при пониженном тоне и моторике оказывает тонизирующее, прокинетическое действие. В эксперименте *in vitro* ингибирует рост 6 подвидов *Helicobacter pylori*. Иберогаст снижает интенсивность изъязвления слизистой оболочки желудка, секреции соляной кислоты, уменьшает концентрацию лейкотриенов, усиливает продукцию муцинов, повышает концентрацию мукопротективного простагландина E₂ в слизистой оболочке желудка.

Фармакокинетика

Данные отсутствуют.

Показания к применению:

— лечение функциональных расстройств ЖКТ (в т.ч. синдрома раздраженного кишечника), проявляющихся тяжестью в эпигастральной области, спазмами желудка или кишечника, отрыжкой, тошнотой, метеоризмом, запором, диареей или их чередованием;

— в составе комплексной терапии гастрита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

Относится к болезням:

- [Гастрит](#)
- [Диарея](#)
- [Запор](#)
- [Отрыжка](#)
- [Спазмы](#)
- [Тошнота](#)
- [Язвенная болезнь](#)
- [Язвенная болезнь желудка](#)

Противопоказания:

— калькулезный холецистит;

— детский возраст (до 18 лет) - из-за недостаточности клинических данных;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С осторожностью: заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга - из-за содержания этанола в препарате.

Способ применения и дозы:

Внутрь, по 20 капель 3 раза/сут, перед или во время еды, с небольшим количеством воды.

Длительность терапии составляет 4 недели.

Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача.

Побочное действие:

Возможны аллергические кожные реакции, одышка, а также тошнота, рвота, диарея. При появлении побочных реакций необходимо отменить препарат и обратиться к врачу.

Передозировка:

До настоящего времени о случаях передозировки не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат не следует применять при беременности, а также в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Взаимодействия с другими лекарственными средствами на настоящий момент неизвестны.

Особые указания и меры предосторожности:

Содержание в составе препарата этилового спирта составляет от 29.5 до 32.6% (по объему). При приеме 1 разовой дозы (20 капель) пациент получает до 0.24 г абсолютного этилового спирта. В максимальной суточной дозе

препарата (60 капель) содержится до 0.72 г абсолютного этилового спирта.

В процессе хранения возможно легкое помутнение или выпадение незначительного осадка, что не оказывает влияния на терапевтическую эффективность препарата.

Перед применением содержимое флакона следует взбалтывать.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

При применении в рекомендуемых дозах препарат не оказывает влияния на способность управлять транспортом и работать с механизмами.

При нарушениях функции печени

С осторожностью: заболевания печени (из-за содержания этанола в препарате).

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям в возрасте до 18 лет из-за недостаточности клинических данных.

Условия хранения:

Препарат хранить в защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Не применять по истечении срока годности.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Iberogast>