Иберогаст (капли)



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Капли для приема внутрь. Во флаконах темного стекла с капельницами и навинчивающимися крышками с контролем первого вскрытия по 20, 50 или 100 мл. 1 фл. в картонной пачке.

Состав:

Капли для приема внутрь	100 мл
активные вещества:	
иберийки горькой *(Iberis amara L., Cruciferae)* целого свежего растения экстракт жидкий (1:1,5–2,5; экстрагент этанол 50%)	15 мл
дягиля лекарственного *(Angelica archangelica L., Umbelliferae)* корней сухих экстракт жидкий (1:2,5–3,5; экстрагент этанол 30%)	10 мл
ромашки аптечной *(Matricaria chamomilla L., Compositae)* цветков сухих экстракт жидкий (1:2–4; экстрагент этанол 30%)	20 мл
тмина обыкновенного *(Carum carvi L., Umbelliferae)* плодов сухих экстракт жидкий (1:2,5–3,5; экстрагент этанол 30%)	10 мл
расторопши пятнистой *(Silybum marianum (L.) Gaertn., Compositae)* плодов сухих экстракт жидкий (1:2,5–3,5; экстрагент этанол 30%)	10 мл

мелиссы лекарственной *(Melissa officinalis L., Labiatae)* листьев сухих экстракт жидкий (1:2,5–3,5; экстрагент этанол 30%)	10 мл
мяты перечной *(Mentha piperita L., Labiatae)* листьев сухих экстракт жидкий (1:2,5–3,5; экстрагент этанол 30%)	5 мл
чистотела майского *(Chelidonium majus L., Papaveraceae)* травы сухой экстракт жидкий (1:2,5–3,5; экстрагент этанол 30%)	10 мл
солодки голой *(Glycyrrhiza glabra L., Leguminosae)* корней сухих экстракт жидкий (1:2,5–3,5; экстрагент этанол 30%)	10 мл
содержание этанола: около 31% (в объемном отношении)	

Описание:

Капли: жидкость темно-коричневого цвета, от прозрачной до немного мутной. В процессе хранения допускается образование незначительного осадка.

Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакологическое действие — противовоспалительное, регулирующее тонус и моторику ЖКТ.

Фармакодинамика

Препарат обладает выраженным противовоспалительным действием, а также нормализует тонус гладкой мускулатуры ЖКТ: способствует устранению спазма без влияния на нормальную перистальтику, а при пониженном тонусе и моторике оказывает тонизирующее, прокинетическое действие. В эксперименте *in vitro* ингибирует рост 6 подвидов *Helicobacter pylori.* Иберогаст® снижает интенсивность изъязвления слизистой оболочки желудка, секреции соляной кислоты, уменьшает концентрацию ЛТ, усиливает продукцию муцинов, повышает концентрацию мукопротективного $ПГЕ_2$ в слизистой оболочке желудка.

Показания к применению:

— для лечения функциональных расстройств ЖКТ (в т.ч. синдрома раздраженного кишечника), проявляющихся тяжестью в эпигастральной области, спазмами желудка или кишечника, отрыжкой, тошнотой, метеоризмом, запором, диареей или их чередованием;

— в составе комплексной терапии гастрита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

Относится к болезням:

- Гастрит
- Диарея
- Запор
- Метеоризм
- Отрыжка
- Спазмы
- Тошнота
- Язвенная болезнь
- Язвенная болезнь желудка

Противопоказания:

— калькулезный холецистит;

— детский и подростковый возраст до 18 лет (из-за недостаточности клинических данных);

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С *осторожностью* следует назначать препарат при заболеваниях печени, алкоголизме, черепно-мозговой травме, заболеваниях головного мозга - из-за содержания этанола в препарате.

Способ применения и дозы:

Препарат принимают внутрь, по 20 капель 3 раза/сут, перед или во время еды, с небольшим количеством воды.

Длительность терапии составляет 4 недели.

Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача.

Побочное действие:

Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота, диарея.

Аллергические реакции: кожные проявления, одышка.

При появлении побочных реакций необходимо отменить препарат и обратиться к врачу.

Передозировка:

До настоящего времени о случаях передозировки препарата не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат не следует применять при беременности и в период грудного вскармливания.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Взаимодействие с другими лекарственными средствами на настоящий момент неизвестно.

Следует учитывать возможность взаимодействия с лекарственными средствами, метаболизм которых осуществляется с участием системы цитохрома Р450 (корни солодки, плоды расторопши, цветки ромашки могут оказывать ингибирующее действие на ряд изоферментов цитохрома Р450). При этом данные эффекты носят дозозависимый характер и описаны при применении отдельных компонентов в концентрациях, многократно превышающих рекомендуемые дозы препарата Иберогаст.

Особые указания и меры предосторожности:

Если выраженность заболевания не уменьшается в течение 14 дней применения препарата, или отмечается усугубление симптомов, или возникают новые жалобы, пациенту необходимо обратиться к врачу.

Содержание в составе препарата этанола составляет от 29.5 до 32.6% (по объему). При приеме 1 разовой дозы (20 капель) пациент получает до 0.24 г абсолютного этилового спирта. В максимальной суточной дозе препарата (60 капель) содержится до 0.72 г абсолютного этилового спирта, что ниже содержания этанола в 200 мл яблочного сока или 75 мл кефира.

Перед применением содержимое флакона следует взбалтывать.

В процессе хранения возможно легкое помутнение или выпадение незначительного осадка, что не оказывает влияния на терапевтическую эффективность препарата.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

При применении препарата следует соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в т.ч. управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Iberogast_kapli