

[Иберогаст \(капли\)](#)



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Капли для приема внутрь. Во флаконах темного стекла с капельницами и навинчивающимися крышками с контролем первого вскрытия по 20, 50 или 100 мл. 1 фл. в картонной пачке.

Состав:

Капли для приема внутрь	100 мл
активные вещества:	
иберийки горькой (<i>Iberis amara</i> L., <i>Cruciferae</i>) целого свежего растения экстракт жидкий (1:1,5-2,5; экстрагент этанол 50%)	15 мл
дягиля лекарственного (<i>Angelica archangelica</i> L., <i>Umbelliferae</i>) корней сухих экстракт жидкий (1:2,5-3,5; экстрагент этанол 30%)	10 мл
ромашки аптечной (<i>Matricaria chamomilla</i> L., <i>Compositae</i>) цветков сухих экстракт жидкий (1:2-4; экстрагент этанол 30%)	20 мл
тмина обыкновенного (<i>Carum carvi</i> L., <i>Umbelliferae</i>) плодов сухих экстракт жидкий (1:2,5-3,5; экстрагент этанол 30%)	10 мл
расторопши пятнистой (<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn., <i>Compositae</i>) плодов сухих экстракт жидкий (1:2,5-3,5; экстрагент этанол 30%)	10 мл

Иберогаст (капли)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

мелиссы лекарственной (<i>Melissa officinalis</i> L., <i>Labiatae</i>) листьев сухих экстракт жидкий (1:2,5-3,5; экстрагент этанол 30%)	10 мл
мяты перечной (<i>Mentha piperita</i> L., <i>Labiatae</i>) листьев сухих экстракт жидкий (1:2,5-3,5; экстрагент этанол 30%)	5 мл
чистотела майского (<i>Chelidonium majus</i> L., <i>Papaveraceae</i>) травы сухой экстракт жидкий (1:2,5-3,5; экстрагент этанол 30%)	10 мл
солодки голой (<i>Glycyrrhiza glabra</i> L., <i>Leguminosae</i>) корней сухих экстракт жидкий (1:2,5-3,5; экстрагент этанол 30%)	10 мл
содержание этанола: около 31% (в объемном отношении)	

Описание:

Капли: жидкость темно-коричневого цвета, от прозрачной до немного мутной. В процессе хранения допускается образование незначительного осадка.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакологическое действие — противовоспалительное, регулирующее тонус и моторику ЖКТ.

Фармакодинамика

Препарат обладает выраженным противовоспалительным действием, а также нормализует тонус гладкой мускулатуры ЖКТ: способствует устранению спазма без влияния на нормальную перистальтику, а при пониженном тонусе и моторике оказывает тонизирующее, прокинетическое действие. В эксперименте *in vitro* ингибирует рост 6 подвидов *Helicobacter pylori*. Иберогаст® снижает интенсивность изъязвления слизистой оболочки желудка, секреции соляной кислоты, уменьшает концентрацию ЛТ, усиливает продукцию муцинов, повышает концентрацию мукопротективного ПГЕ₂ в слизистой оболочке желудка.

Показания к применению:

— для лечения функциональных расстройств ЖКТ (в т.ч. синдрома раздраженного кишечника), проявляющихся тяжестью в эпигастриальной области, спазмами желудка или кишечника, отрыжкой, тошнотой, метеоризмом, запором, диареей или их чередованием;

— в составе комплексной терапии гастрита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

Относится к болезням:

- [Гастрит](#)
- [Диарея](#)
- [Запор](#)
- [Метеоризм](#)
- [Отрыжка](#)
- [Спазмы](#)
- [Тошнота](#)
- [Язвенная болезнь](#)
- [Язвенная болезнь желудка](#)

Противопоказания:

- калькулезный холецистит;
- детский и подростковый возраст до 18 лет (из-за недостаточности клинических данных);
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С *осторожностью* следует назначать препарат при заболеваниях печени, алкоголизме, черепно-мозговой травме, заболеваниях головного мозга - из-за содержания этанола в препарате.

Способ применения и дозы:

Препарат принимают внутрь, по 20 капель 3 раза/сут, перед или во время еды, с небольшим количеством воды.

Длительность терапии составляет 4 недели.

Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача.

Побочное действие:

Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота, диарея.

Аллергические реакции: кожные проявления, одышка.

При появлении побочных реакций необходимо отменить препарат и обратиться к врачу.

Передозировка:

До настоящего времени о случаях передозировки препарата не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат не следует применять при беременности и в период грудного вскармливания.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Взаимодействие с другими лекарственными средствами на настоящий момент неизвестно.

Следует учитывать возможность взаимодействия с лекарственными средствами, метаболизм которых осуществляется с участием системы цитохрома P450 (корни солодки, плоды расторопши, цветки ромашки могут оказывать ингибирующее действие на ряд изоферментов цитохрома P450). При этом данные эффекты носят дозозависимый характер и описаны при применении отдельных компонентов в концентрациях, многократно превышающих рекомендуемые дозы препарата Иберогаст.

Особые указания и меры предосторожности:

Если выраженность заболевания не уменьшается в течение 14 дней применения препарата, или отмечается усугубление симптомов, или возникают новые жалобы, пациенту необходимо обратиться к врачу.

Содержание в составе препарата этанола составляет от 29.5 до 32.6% (по объему). При приеме 1 разовой дозы (20 капель) пациент получает до 0.24 г абсолютного этилового спирта. В максимальной суточной дозе препарата (60 капель) содержится до 0.72 г абсолютного этилового спирта, что ниже содержания этанола в 200 мл яблочного сока или 75 мл кефира.

Перед применением содержимое флакона следует взбалтывать.

В процессе хранения возможно легкое помутнение или выпадение незначительного осадка, что не оказывает влияния на терапевтическую эффективность препарата.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Иберогаст (капли)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

При применении препарата следует соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в т.ч. управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/lberogast_kapli