# Ибупрофен (гель)



## Код АТХ:

M01AE01

# Международное непатентованное название (Действующее вещество):

• Ибупрофен

### Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель Госреестр $^{\mathrm{MHH}}$  Википедия $^{\mathrm{MHH}}$  РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com $^{\mathrm{ahr}}$ 

### Форма выпуска:

 $\Diamond$  **Гель для наружного применения 5%** бесцветный или со светло-желтым оттенком, прозрачный, со специфическим запахом: допускается наличие опалесценции.

and the second s	****
	1 r
ибупрофен	50 мг

Вспомогательные вещества: пропиленгликоль, этанол, карбомер 940, димексид, триэтаноламин, метилпарагидроксибензоат, масло неролиевое, масло лавандовое, вода очищенная.

20 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

30 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

50 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

100 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

• Ненаркотические анальгетики, включая нестероидные и другие противовоспалительные средства

## Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Нестероидный противовоспалительный препарат (НПВП).

### Показания к применению:

- воспалительные и дегенеративные заболевания опорно-двигательного аппарата;
- артрит (ревматоидный, псориатический);

— болевой синдром при ревматизме,
— при обострении подагры;
— плечелопаточный периартрит;

– болезнь Бехтерева (спондилит анкилозирующий);

— деформирующий остеоартроз;

— остеохондроз с корешковым синдромом;

радикулит;

— ишиас:

— миалгия (ревматического и неревматического происхождения); люмбаго; тендинит, тендовагинит, бурсит; травмы (спортивные, производственные, бытовые) без нарушения целостности мягких тканей (в т.ч. ушибы, посттравматические отеки мягких тканей).

### Относится к болезням:

- Болевой синдром
- Ишиас
- Корешковый синдром
- Люмбаго
- Миалгия
- Остеоартрит
- Остеоартроз
- Остеохондроз
- Отеки
- Подагра
- Псориаз
- Радикулит
- Ревматизм
- Тендинит
- Тендовагинит
- Травмы
- <u>Ушиб</u>
- Ушибы

## Противопоказания:

- повышенная индивидуальная чувствительность к ибупрофену или другим компонентам препарата, в том числе другим НПВП;
- повышенная чувствительность к ацетилсалициловой кислоте и другим НПВП, проявляющиеся приступом бронхиальной астмы или другими аллергическими реакциями;
- мокнущие дерматозы, экзема;
- нарушение целостности кожных покровов (в том числе инфицированные раны и ссадины);
- детский возраст (до 6 лет),
- беременность (III триместр).

Следует соблюдать *осторожность* при печеночной порфирии (обострение), эрозивно-язвенных поражениях ЖКТ, тяжелых нарушениях функции печени и почек, применении в детском возрасте (до 12 лет), беременности (I и II триместр), а также в период лактации (грудное вскармливание).

Препарат не следует наносить на открытую раневую поверхность, поврежденную кожу или слизистые оболочки (избегать попадания в глаза). После нанесения не следует накладывать окклюзионную повязку.

После применения препарата следует тщательно вымыть руки.

# Способ применения и дозы:

Наружно. **Взрослым и детям с 12 лет** полоску геля длиной 4-10 см (соответствует 50-125 мг ибупрофена) наносят на область поражения и тщательно втирают легкими движениями до полного впитывания. Повторное применение препарата возможно только через 4 ч и не более 4 раз в сутки. Необходимое количество препарата зависит от размера болезненной зоны.

Детям с 6 до 12 лет полоску геля длиной 2-4 см наносят на область поражения не более 3-х раз в сутки.

Продолжительность лечения - 2-3 недели.

## Побочное действие:

*Аллергические реакции*: возможно - бронхоспазм (при повышенной чувствительности к НПВП); редко - гиперемия кожи, сыпь, отек, ощущение жжения, покалывания или зуд кожи.

## Передозировка:

*Симптомы:* при применении больших количеств геля на обширной поверхности кожи или попадания в полость рта может наблюдаться боль в животе, тошнота, рвота, сонливость, головная боль.

*Лечение:* следует удалить остатки геля с поверхности кожи или из полости рта. При попадании больших количеств препарата в полость рта показано промывание желудка, применение солевых слабительных и симптоматическая терапия.

### Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат нельзя применять в III триместре беременности. Использование при грудном вскармливании, в I и II триместрах беременности возможно после консультации с врачом. Применять с осторожностью в период лактации.

# Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Клинически значимого взаимодействия с другими лекарственными препаратами не описано.

Может усиливать системное действие других НПВП, принимаемых перорально.

### Особые указания и меры предосторожности:

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Применение геля Ибупрофен не оказывает влияния на деятельность, требующую повышенного внимания, координацию движений, высокой скорости психических и физических реакций (в т.ч. у водителей фанспорта, лиц, обслуживающих машины).

### При нарушениях функции почек

Следует соблюдать осторожность при тяжелых нарушениях функции почек.

### При нарушениях функции печени

Следует соблюдать осторожность при тяжелых нарушениях функции печени.

#### Применение в детском возрасте

Следует соблюдать осторожность при применении в детском возрасте (до 12 лет). Детям до 6 лет применение препарата противопоказано.

## Условия хранения:

Хранить при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

# Срок годности:

2 года.

# Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/lbuprofen\_gel