Ибустрин

Код АТХ:

- B01AC10

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Индобуфен

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН]
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакотерапевтическая группа:

- Гематотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Антиагрегант. Подавляет активность тромбоцитов и препятствует тромбообразованию при контакте с инородными поверхностями или при патологических изменениях сосудов. Не оказывает влияния на факторы свертывания крови, несколько увеличивает время кровотечения. Угнетает ферменты ЦОГ и тромбоксансинтетазу.

Показания к применению:

Профилактика тромбообразования при ишемических цереброваскулярных и сердечно-сосудистых заболеваниях, атеросклеротических поражениях периферических сосудов, тромбозе вен, диабете, нарушениях липидного обмена, во время гемодиализа.

Относится к болезням:

- Атеросклероз
- Тромбоз

Противопоказания:

Геморрагические нарушения, эрозивно-язвенные поражения ЖКТ в фазе обострения, повышенная чувствительность к индобуфену, беременность.

Способ применения и дозы:

При приеме внутрь суточная доза составляет 200-400 мг (после еды). Для длительного применения рекомендуется доза 200 мг/сут. Пациентам пожилого возраста (старше 65 лет) - 100-200 мг/сут. Перед сеансом гемодиализа дозу подбирают индивидуально, в зависимости от КК: более 80 мл/мин - 100-200 мг 2 раза/сут, при 40-80 мл/мин - 100 мг 1 или 2 раза/сут, менее 40 мл/мин - 100 мг через день или 1 раз/сут.

Побочное действие:

Диспептические явления, аллергические реакции, кровоточивость десен, носовые кровотечения, желудочно-кишечные кровотечения, гематурия.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан к применению при беременности.

Особые указания и меры предосторожности:

С осторожностью применяют при заболеваниях ЖКТ в анамнезе, сахарном диабете (чаще исследовать кровь на сахар), а также на фоне лечения другими антиагрегантными средствами или НПВС.

При нарушениях функции почек

Перед сеансом гемодиализа дозу препарата подбирают индивидуально, в зависимости от КК: более 80 мл/мин - 100-200 мг 2 раза/сут, при 40-80 мл/мин - 100 мг 1 или 2 раза/сут, менее 40 мл/мин - 100 мг через день или 1 раз/сут.

Применение в пожилом возрасте

Пациентам пожилого возраста (старше 65 лет) препарат назначается в дозировке 100-200 мг/сут.

Источник: http://drugs.thead.ru/Ibustrin