Идеос



Код АТХ:

- A12AX

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Кальция карбонат
- Колекальциферол

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] [МНН] Википедия[МНН] [МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Таблетки жевательные*** квадратные, с закругленными краями, с фаской, белого или почти белого цвета.

	1 таб.
кальция карбонат	1.25 г,
в т.ч. элементарный кальций	500 мг
колекальциферол (вит. D_3)	400 МЕ

Вспомогательные вещества: ксилитол, сорбитол, поливинилпирролидон, магния стеарат, лимонный ароматизатор.

15 шт. - тубы полипропиленовые (1) - коробки картонные.
15 шт. - тубы полипропиленовые (2) - коробки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Метаболики
- Метаболики

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат, регулирующий обмен кальция и фосфора в организме. Снижает резорбцию (рассасывание) и увеличивает плотность костной ткани, восполняя недостаток кальция и витамина D_3 в организме.

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Идеос не предоставлены.

Показания к применению:

— для восполнения дефицита кальция и витамина D_3 у лиц пожилого возраста;

— для профилактики и комплексной терапии остеопороза, вызванного дефицитом кальция и витамина D_3.

Относится к болезням:

- Остеопороз

Противопоказания:

— гиперкальциемия;

— гиперкальциурия;

— мочекаменная болезнь (образование кальциевых камней);

— остеопороз, обусловленный длительной иммобилизацией;

— повышенная чувствительность к витамину D и другим компонентам препарата.

С *осторожностью* следует назначать препарат при саркоидозе и почечной недостаточности.

Способ применения и дозы:

Средняя суточная доза составляет 2 таб. (по 1 таб. утром и вечером). Таблетки следует разжевывать. Курс лечения устанавливают индивидуально.

Побочное действие:

Со стороны пищеварительной системы: запор или диарея, вздутие живота, боль в области эпигастрия, тошнота.

Прочие: возможны аллергические реакции; редко - увеличение уровня кальция в крови или моче при длительном лечении.

Передозировка:

Симптомы: тошнота, рвота, жажда, запор. При длительной передозировке возможно повышенное отложение кальция в сосудах и тканях.

Лечение: следует немедленно прекратить прием препарата. При необходимости проводят симптоматическую терапию.

Применение при беременности и кормлении грудью:

При беременности и в период лактации суточная доза кальция не должна превышать 1.5 г, суточная доза витамина D_3 - 600 МЕ.

Передозировка препарата при беременности может привести к нарушению психического и физического развития ребенка.

При назначении препарата в период лактации следует учитывать, что колекальциферол и его метаболиты выводятся с грудным молоком.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении витамин А снижает токсичность витамина D.

При одновременном применении фенитоин, барбитураты, глюкокортикостероиды снижают действие витамина D_3.

При одновременном применении глюкокортикоиды снижают абсорбцию кальция.

При одновременном применении колестирамин, слабительные (парафиновое масло) снижают абсорбцию витамина D_3.

При одновременном применении Идеос снижает всасывание бисфосфонатов, натрия фторида, поэтому интервал между приемом этих препаратов должен составлять не менее 2 ч.

При одновременном применении Идеос снижает всасывание антибиотиков из группы тетрациклина, поэтому интервал между приемом этих препаратов должен составлять не менее 3 ч.

При одновременном приеме с препаратом Идеос повышается токсичность сердечных гликозидов. Поэтому необходим периодический контроль ЭКГ и клинического состояния пациента.

При одновременном применении препарата Идеос с тиазидными диуретиками увеличивается риск развития гиперкальциемии. Фуросемид и другие "петлевые" диуретики увеличивают выведение кальция почками.

Особые указания и меры предосторожности:

В период лечения необходимо постоянно контролировать содержание кальция в моче и концентрацию кальция и креатинина в плазме крови. В случае появления кальциурии, превышающей 7.5 ммоль/сут (300 мг/сут), необходимо уменьшить дозу или прекратить прием препарата.

У пожилых людей потребность в кальции составляет 1.5 г/сут, в витамине D_3 - 500-1000 МЕ/сут.

Во избежание передозировки необходимо учитывать дополнительные источники витамина D_3. Следует избегать одновременного применения препарата Идеос с витаминными комплексами, содержащими кальций и витамин D_3.

Пациент должен быть информирован о том, что в случае пропуска одного приема препарата не допускается удвоение очередной дозы.

Для того чтобы избежать нежелательного лекарственного взаимодействия, пациент должен информировать врача о других дополнительно принимаемых препаратах.

При нарушениях функции почек

С *осторожностью* следует назначать препарат при почечной недостаточности.

Противопоказано применение препарата при мочекаменной болезни (образовании кальциевых камней).

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Ideos