Ифенек



Код АТХ:

- G01AF05

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Эконазол

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Крем для наружного применения 1%***	**1 г**
эконазола нитрат	10 мг

Вспомогательные вещества: кислота бензойная, твердые жиры, гидроксианизол бутилированный, полиоксиэтиленгликоль пальмитат стеарат, вода очищенная.

30 г - тубы (1) - пачки картонные.

◊ ***Порошок для наружного применения 1%***	**1 г**
эконазола нитрат	10 мг

Вспомогательные вещества: тальк, цинка оксид, кремний коллоидный безводный.

30 г - бутылки полиэтиленовые.

◊ ***Раствор для наружного применения 1%***	**1 мл**
эконазол	10 мг

Вспомогательные вещества: полисорбат 20, бензиловый спирт, сорбитана монолаурат, N-(2-гидроксиэтил)-N-(2-(лауриламино)-этиламиноацетат натрия 3,6,9-триоксадокозил сульфат, полиоксиэтиленгликоль 6000 дистеарат, кислота молочная, вода очищенная.

60 мл - бутылки полиэтиленовые.

Суппозитории вагинальные	**1 супп.**
эконазола нитрат	150 мг

Вспомогательные вещества: глицериды полусинтетические.

6 шт. - стрипы (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Противогрибковый препарат, синтетическое производное имидазола. Оказывает местное фунгицидное и бактерицидное действие. Блокирует синтез эргостерола, регулирующего проницаемость клеточной стенки грибов.

Активен в отношении Trichophyton, Microsporum, Epidermophyton, дрожжеподобных грибов рода Candida, плесневых грибов, а также Malassezia furfur (Pitysporum orbiculare), Corynebacterium minutissimum. *Активен также в отношении* некоторых грамположительных бактерий (Streptococcus spp., Staphylococcus spp.).

Фармакокинетика

Быстро растворяется в липидах, хорошо проникает в ткани.

При нанесении на кожу препарата в форме крема или порошка системная абсорбция незначительна.

Показания к применению:

Для вагинальных суппозиториев и раствора для наружного применения:

— вульвовагинит;

— кольпит грибковой этиологии.

Для крема и порошка для наружного применения:

— микозы кожи, слизистых оболочек и волосистой части головы;

— разноцветный лишай;

— эритразма.

Относится к болезням:

- Вагинит
- Вульвит
- Кольпит
- Кольпит
- Лишай
- Микоз
- Разноцветный лишай
- Эритразма

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Непосредственно перед применением **раствор для наружного применения** в объеме 10 $см^3$ (1 доза) необходимо развести в теплой воде в соотношении 1:1 и промыть наружные половые органы. Препарат применяют 1-2 раза/сут в течение 3-5 дней.

Вагинальные суппозитории вводят глубоко во влагалище в положении лежа 1 раз/сут (непосредственно перед сном) в течение 3 дней. При недостаточной эффективности 3-дневного курса лечения возможно увеличение продолжительности лечения до 6 дней и проведение повторного курса через 10 дней.

Крем и порошок наносят на пораженные участки кожи и слегка втирают. При *микозе стоп, кистей и туловища* крем наносят 1 раз/сут, при *разноцветном лишае* - 2 раза/сут (утром и вечером).

Для *профилактики рецидива микоза стоп* после разрешения клинической ситуации лечение следует продолжить еще в течение 2 недель.

Побочное действие:

Крем и порошок для наружного применения

Местные реакции: редко - чувство жжения, раздражение, покраснение кожи, сыпь; при длительном применении - гиперпигментация и атрофические изменения кожи.

Вагинальные суппозитории и раствор для наружного применения

Местные реакции: чувство жжения, зуд.

Прочие: головная боль, спазмы мышц таза, кожная сыпь.

При развитии побочных эффектов следует рассматривать возможность отмены препарата и назначения других лекарственных средств.

Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата Ифенек не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата при беременности возможно только в тех случаях, когда предполагаемая польза для матери превышает возможный риск для плода.

При необходимости назначения в период лактации следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие или несовместимость препарата Ифенек с другими лекарственными средствами не описано.

Особые указания и меры предосторожности:

При вульвовагинальных микозах обязательно лечение полового партнера.

Возможно применение препарата в форме вагинальных суппозиториев при менструации.

Препарат в форме порошка и крема предназначен только для наружного применения. При отсутствии эффекта в указанные сроки терапии лечение следует прекратить и уточнить диагноз.

Условия хранения:

Препарат следует хранить при температуре не выше 25°C.

Срок годности препарата в форме раствора и крема для наружного применения - 3 года, в форме вагинальных суппозиториев - 2 года, в форме порошка для наружного применения - 5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Ifenek