

[Ифирал \(капли\)](#)



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

♦ **Капли глазные 2%** в виде прозрачного раствора от бесцветного до бледно-желтого цвета.

	1 мл
хромогликат натрия	20 мг

Вспомогательные вещества: натрия хлорид, динатрия эдетат, натрия борат, борная кислота, бензалкония хлорид, вода д/и.

5 мл - флакон-капельницы пластиковые (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Противоаллергическое средство, оказывает мембраностабилизирующее действие, блокирует поступление ионов кальция в тучные клетки, препятствует дегрануляции тучных клеток и выделению из них гистамина, брадикинина, лейкотриенов (в т.ч. медленно реагирующей субстанции) и других биологически активных веществ. Препарат наиболее эффективен в качестве средства профилактики. Заметный клинический эффект наступает через несколько дней или неделю.

Фармакокинетика

Абсорбция через слизистую оболочку глаза незначительна. Системная биодоступность - менее 0.03%. $T_{1/2}$ - 5-10 мин.

Показания к применению:

- аллергический конъюнктивит;
- аллергический кератит, кератоконъюнктивит;
- синдром сухого глаза;
- перенапряжение, чрезмерная утомляемость глаз;
- раздражение слизистой оболочки глаз, обусловленное аллергическими реакциями (факторы окружающей среды, профессиональные вредности, средства бытовой химии, косметические средства, офтальмологические лекарственные формы, растения и домашние животные).

Относится к болезням:

- [Аллергия](#)
- [Астения](#)
- [Кератит](#)
- [Кератоконус](#)
- [Синдром сухого глаза](#)

Противопоказания:

- детский возраст до 4 лет;
- беременность;
- период лактации;
- повышенная чувствительность к кромоглату натрия или к любому другому компоненту препарата.

Способ применения и дозы:

Взрослым и детям старше 4 лет закапывают по 1-2 капли в каждый конъюнктивальный мешок 4 раза/сут с интервалом 4-6 ч. При необходимости дозу можно увеличить до 6-8 закапываний.

Побочное действие:

Со стороны органа зрения: нарушение четкости зрительного восприятия, жжение в глазу, отек конъюнктивы, ощущение инородного тела, сухость глаз, слезотечение, ячмень, мейбомит, поверхностное поражение эпителия роговицы.

Передозировка:

Данные по передозировке препарата отсутствуют.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Снижает потребность в применении офтальмологических препаратов, содержащих ГКС.

Особые указания и меры предосторожности:

При применении капель в обычных флаконах-капельницах следует избегать ношения мягких контактных линз из-за содержания бензалкония хлорида; жесткие контактные линзы необходимо снимать за 15 мин до закапывания и одевать через 15 мин после закапывания препарата.

Флакон необходимо закрывать после каждого использования. Не следует прикасаться кончиком пипетки к глазу.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

В период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Применение в детском возрасте

Ифирал (капли)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Противопоказан детям в возрасте до 4 лет.

Условия хранения:

Список Б. Хранить при температуре не выше 30°C в защищенном от света, недоступном для детей месте.

После вскрытия флакона препарат следует использовать в течение 1 месяца. Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/lfiral_kapli