

Иммунал



Код АТХ:

- [L03AX](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Эхинацеи пурпурной травы сок](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)

[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Таблетки** светло-коричневого цвета с вкраплениями, круглые, плоскоцилиндрические, с запахом ванили.

	1 таб.
высушенный сок травы эхинацеи пурпурной	80 мг

Вспомогательные вещества: кремния диоксид коллоидный, лактоза, магния стеарат, натрия сахаринат, ванилин, ароматизатор вишневый.

10 шт. - блистеры (2, 3, 4) - пачки картонные.

20 шт. - блистеры (1, 2, 3) - пачки картонные.

◇ **Раствор для приема внутрь** от прозрачного до мутного, коричневого цвета; в процессе хранения допустимо образование хлопьевидного осадка.

	1 мл
сок травы эхинацеи пурпурной	0.8 мл

Вспомогательные вещества: этанол, сорбитол.

50 мл - флаконы темного стекла (1) в комплекте с дозировочной пипеткой - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Иммуностропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Иммуностимулирующий препарат. Эхинацея пурпурная (*Echinacea purpurea* (L.) Moench) содержит активные вещества, усиливающие неспецифический иммунитет. Повышая число лейкоцитов (гранулоцитов) и активизируя фагоцитоз, препарат подавляет рост и размножение микроорганизмов. Кроме того, установлено противовирусное действие травы эхинацеи пурпурной в отношении вирусов гриппа и герпеса.

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Иммунал не предоставлены.

Показания к применению:

- для укрепления иммунитета при неосложненных острых инфекционных заболеваниях и при предрасположенности к частым простудным заболеваниям;
- профилактика простудных заболеваний и гриппа;
- в качестве вспомогательного средства при продолжительной антибиотикотерапии хронических инфекционных заболеваний, сопровождающихся снижением иммунитета.

Относится к болезням:

- [Грипп](#)
- [Инфекции](#)

Противопоказания:

- прогрессирующие системные и аутоиммунные заболевания (туберкулез, лейкозы, коллагенозы, рассеянный склероз, ВИЧ-инфекция, СПИД);
- детский возраст до 1 года (для раствора для приема внутрь);
- детский возраст до 4 лет (для таблеток);
- повышенная чувствительность к компонентам препарата и растениям семейства сложноцветных.

Способ применения и дозы:

Препарат в форме раствора для приема внутрь назначают **взрослым и подросткам старше 12 лет** по 2.5 мл 3 раза/сут; **детям в возрасте от 6 до 12 лет** - по 1.5 мл 3 раза/сут; **детям в возрасте от 1 года до 6 лет** - по 1 мл 3 раза/сут.

Препарат в форме таблеток назначают **взрослым и подросткам старше 12 лет** по 1 таб. 3-4 раза/сут; **детям в возрасте от 6 до 12 лет** - по 1 таб. 1-3 раза/сут; **детям в возрасте от 4 до 6 лет** - по 1 таб. 1-2 раза/сут.

Для достижения клинического эффекта Иммунал следует принимать не менее 1 недели.

Продолжительность непрерывного приема - не более 8 недель.

Таблетки следует запивать водой. Для маленьких детей рекомендуется растолочь таблетку и смешать с небольшим количеством воды, чая или сока.

Для облегчения правильного дозирования раствора для приема внутрь в каждую упаковку вложена градуированная дозировочная пипетка. Перед приемом необходимое количество капель следует развести в небольшом объеме воды.

Побочное действие:

В отдельных случаях возможно развитие реакций повышенной чувствительности: кожная сыпь, зуд, головокружение, бронхоспазм, ангионевротический отек, синдром Стивенса-Джонсона, анафилактический шок, снижение АД, одышка.

Прочие: лейкопения (при непрерывном применении более 8 недель).

Передозировка:

Симптомы интоксикации вследствие передозировки препарата не отмечены.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Данные о негативном воздействии Иммунала отсутствуют.

Перед применением препарата при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) необходимо проконсультироваться с врачом.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Раствор для приема внутрь содержит этанол, в связи с чем препарат может усиливать или изменять эффект других лекарственных препаратов.

Клинически значимое лекарственное взаимодействие отмечено при применении антибиотиков группы цефалоспоринов (цефамандол, цефотетан, цефменоксим, цефоперазон, моксалактам) и одновременном приеме этанола (даже в небольших количествах). Реакция пациента характеризовалась покраснением лица, тошнотой, повышенным потоотделением, головной болью, учащенным сердцебиением. В связи с этим Иммунал в форме раствора для приема внутрь не следует применять одновременно с вышеперечисленными антибиотиками. Прием Иммунала возможен только через 3 дня после окончания курса лечения указанными цефалоспоридами.

При одновременном применении с иммунодепрессантами отмечается взаимное ослабление действия.

Сообщения о каком-либо взаимодействии с другими лекарственными средствами отсутствуют.

Особые указания и меры предосторожности:

Перед применением препарата Иммунал у детей в возрасте до 12 лет и пациентов с аллергическими заболеваниями и бронхиальной астмой в анамнезе необходимо проконсультироваться у лечащего врача.

В случае возникновения побочных эффектов следует прекратить прием препарата Иммунал и обратиться к врачу.

Если симптомы заболевания сохраняются более 10 дней необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

Иммунал раствор для приема внутрь содержит 20% этанола (т.е. содержание спирта в максимальной разовой дозе эквивалентно 1 чайной ложке сухого вина).

При хранении допустимо выпадение хлопьевидного осадка, состоящего из активных полисахаридов. Перед употреблением тщательно встряхнуть флакон.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Не требуется специальных предосторожностей.

Применение в детском возрасте

Противопоказан в детском возрасте до 1 года (для раствора для приема внутрь); в детском возрасте до 4 лет (для таблеток).

Препарат в форме раствора для приема внутрь назначают **детям в возрасте от 6 до 12 лет** - по 1.5 мл 3 раза/сут; **детям в возрасте от 1 года до 6 лет** - по 1 мл 3 раза/сут.

Препарат в форме таблеток назначают **детям в возрасте от 6 до 12 лет** - по 1 таб. 1-3 раза/сут; **детям в возрасте от 4 до 6 лет** - по 1 таб. 1-2 раза/сут.

Таблетки следует запивать водой. Для маленьких детей рекомендуется растолочь таблетку и смешать с небольшим количеством воды, чая или сока.

Иммунал

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C. Срок годности раствора для приема внутрь – 2 года, таблеток - 3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Immunal>