Иммунал Плюс С



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Раствор для приема внутрь*** от прозрачного до мутного, коричневого цвета, со специфическим запахом; допустимо образование осадка.

	1 мл
высушенный сок травы эхинацеи пурпурной*	46.5 мг
аскорбиновая кислота**	20 мг

Вспомогательные вещества: калия сорбат - 2 мг, динатрия эдетат - 0.5 мг, ароматизатор апельсиновый - 1.5 мг, мальтитол (жидкий) - 650 мг, натрия гидроксид - 1.6 мг, вода очищенная - 486.1 мг.

50 мл - флаконы желтого стекла (1) в комплекте с градуированным дозировочным шприцем - пачки картонные.

* высушенный сок травы эхинацеи пурпурной получают из свежесобранной травы эхинацеи пурпурной - Echinacea purpurea L. (Moench), в среднем соотношение сок эхинацеи : высушенный сок эхинацеи составляет 18-25:1; соотношение свежесобранная трава : высушенный сок - 30-60:1.
** аскорбиновая кислота добавляется с избытком 10% с целью стабилизации.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Иммунал плюс С является иммуностимулирующим препаратом, изготовленным из лекарственного растительного сырья.

Эхинацея пурпурная (Echinacea purpurea) содержит активные вещества, усиливающие естественные защитные силы организма и действующие в качестве неспецифических стимуляторов. Повышая число лейкоцитов (гранулоцитов) и активизируя фагоцитоз, действующие вещества препарата подавляют размножение микроорганизмов в организме человека и способствуют уничтожению болезнетворных бактерий. Кроме того, установлено противовирусное действие травы эхинацеи пурпурной в отношении возбудителей гриппа и

Входящая в состав препарата аскорбиновая кислота (витамин С) является мощным антиоксидантом и защищает клетки от повреждения свободными радикалами, образующимися при инфекционно-воспалительных заболеваниях. Аскорбиновая кислота усиливает иммунный ответ организма, способствуя повышению сывороточной концентрации интерферона и защитных антител.

Показания к применению:

Для укрепления иммунитета с целью:

— профилактики простудных заболеваний и гриппа;

— комплексного лечения инфекционно-воспалительных заболеваний респираторного тракта для ускорения процесса выздоровления;

— также в качестве источника витамина С, необходимого при острых респираторных заболеваниях;

— при антибиотикотерапии хронических инфекционных заболеваний, сопровождающихся снижением иммунитета.

Относится к болезням:

- Грипп
- Инфекции
- Острые респираторные заболевания

Противопоказания:

— прогрессирующие системные и аутоиммунные заболевания, такие как туберкулез, лейкозы, коллагснозы, рассеянный склероз, СПИД или ВИЧ-инфекция.

Способ применения и дозы:

Применять внутрь независимо от приема пищи.

Дети старше 12 лет и взрослые: по 2-3-мл 3 раза/сут;

Дети в возрасте от 4 до 12 лет: по 1-2 мл, 3 раза/сут;

Дети в возрасте от 1 года до 4 лет: по 1 мл 3 раза\сут;

Для достижения терапевтического эффекта Иммуналплюс С следует принимать в течение 7-10 дней. Повторные курсы возможны после 14-дневного перерыва.

Побочное действие:

В отдельных случаях возможно развитие реакций повышенной чувствительности: кожная сыпь, зуд, головокружение, бронхоспазм, ангионевротический отек, синдом Стивенса-Джонсона, анафилактический шок.

Передозировка:

Симптомы интоксикации вследствие передозировки препарата не отмечены.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Исследований по взаимодействию препаратов эхинацеи пурпурной с другими лекарственными препаратами не проводилось.

При применении в рекомендованных дозах препарата Иммунал плюс С клинически значимые взаимодействия аскорбиновой кислоты и других лекарственных препаратов отсутствуют.

Особые указания и меры предосторожности:

Перед применением препарата Иммунал плюс С пациентам с аллергическими заболеваниями и бронхиальной астмой и у детей до 12 лет необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

В случае возникновения побочных эффектов следует прекратить прием препарата Иммунал плюс С и обратиться к врачу.

При хранении допустимо выпадение хлопьевидного осадка, состоящего из активных полисахаридов. Перед употреблением тщательно встряхнуть флакон.

Применение в детском возрасте

Дети старше 12 лет и взрослые: по 2-3-мл 3 раза/сут;

Дети в возрасте от 4 до 12 лет: по 1-2 мл, 3 раза/сут;

Дети в возрасте от 1 года до 4 лет: по 1 мл 3 раза\сут;

Условия хранения:

Препарат хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25°С. Хранить в недоступном для детей месте.

Не использовать препарат после истечения срока годности.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Immunal_Plyus_S