Иммунекс

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Сироп*** вязкий, прозрачный, от светло-коричневого до коричневого с красноватым или зеленоватым оттенком цвета со слабым ароматным запахом.

	100 г
экстракт эхинацеи пурпурной	10 г

Вспомогательные вещества: натрия бензоат, сорбит пищевой, сахароза, масло мяты перечной, вода очищенная.

50 г - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.
100 г - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.
125 г - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Иммуностимулирующий препарат растительного происхождения. Препарат оказывает иммуностимулирующее и противовоспалительное действие. Повышает фагоцитарную активность нейтрофилов и макрофагов; стимулирует продукцию интерлейкина-1; индуцирует трансформацию В-лимфоцитов в плазматические клетки; усиливает функцию Т-хелперов; стимулирует костномозговое кроветворение, в результате этого увеличивается количество лейкоцитов и клеток РЭС.

Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике препарата Иммунекс не предоставлены.

Показания к применению:

Профилактика и лечение (в составе комплексной терапии):

— острых и хронических респираторных заболеваний;

— хронических рецидивирующих герпетических инфекций.

В качестве вспомогательного средства при длительной терапии антибиотиками, воздействии ионизирующей радиации.

Относится к болезням:

- Герпес
- Инфекции

Противопоказания:

— системные и аутоиммунные заболевания (туберкулез, лейкоз, рассеянный склероз, СПИД или ВИЧ-инфекция);

— детский возраст до 12 лет;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата (в т.ч. к растениям семейства сложноцветных).

Способ применения и дозы:

Препарат предназначен для приема внутрь.

Взрослым и детям старше 12 лет *с целью профилактики* назначают по 5 мл 3 раза/сут.

При острых состояниях - однократно 10 мл, затем по 5 мл каждые 2 ч в первые 2 дня, после этого продолжают лечение средними дозами. Курс лечения – не более 8 недель.

Побочное действие:

Аллергические реакции: гиперемия, отек лица, одышка, головокружение, снижение АД.

Передозировка:

Данные о передозировке препарата Иммунекс не предоставлены.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Не рекомендуется назначать при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Этанол, входящий в состав, может влиять на эффективность других лекарственных препаратов (в частности, снижать активность иммунодепрессантов).

Особые указания и меры предосторожности:

Препарат содержит около 5% этанола, 22.5% глюкозы.

Группу риска составляют больные алкоголизмом, сахарным диабетом, пациенты с тяжелыми нарушениями функции печени.

При нарушениях функции печени

С осторожностью применять препарат у пациентов с тяжелыми нарушениями функции печени.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей, прохладном, защищенном от света месте. Срок годности – 2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Immuneks