

[Иммуноглобулин Человека Антистафилококковый](#)



Код АТХ:

- [J06BV08](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Иммуноглобулин человека противостафилококковый](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Раствор для в/м введения	1 доза
иммуноглобулин человека антистафилококковый (антиальфаствафилолизин)	100 МЕ

Вспомогательные вещества: глицин, натрия хлорид.

3 мл (1 доза) - ампулы (10) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Иммуностропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат представляет собой иммунологически активную белковую фракцию, содержащую антитела к стафилококковому экзотоксину, выделенную из плазмы крови человека, свободной от вирусов ВИЧ-1, ВИЧ-2, гепатита С и поверхностного антигена вируса гепатита В.

Активным компонентом препарата являются иммуноглобулины, обладающие активностью антител к стафилококковому экзотоксину.

Препарат повышает также неспецифическую резистентность организма.

Фармакокинетика

C_{max} антител в крови достигается через 24 ч, $T_{1/2}$ антител из организма составляет 4-5 недель.

Показания к применению:

— заболевания стафилококковой этиологии у детей и взрослых (в составе комбинированной терапии).

Противопоказания:

— аллергические реакции или тяжелые системные реакции на препараты крови человека в анамнезе.

В случаях тяжелого сепсиса единственным противопоказанием для введения иммуноглобулина является анафилактический шок на препараты крови человека в анамнезе.

Способ применения и дозы:

Доза препарата и кратность его введения зависят от показаний к применению.

При *генерализованной стафилококковой инфекции* минимальная разовая доза препарата составляет 5 МЕ антистафилолизина на 1 кг массы тела.

Для **детей младше 5 лет** разовая доза препарата должна быть не менее 100 МЕ.

При *более легких локальных формах инфекции* минимальная разовая доза препарата составляет не менее 100 МЕ.

Препарат вводят в/м в верхний наружный квадрант ягодичной мышцы или наружную поверхность бедра. Запрещается вводить препарат в/в.

До начала инъекции ампулы с препаратом выдерживают в течение 2 ч при комнатной температуре (18-22)°С. Во избежание образования пены, препарат набирают в шприц иглой с широким просветом. Препарат во вскрытой ампуле хранению не подлежит.

Лица, получившие препарат, должны находиться под наблюдением в течение 30 минут. В помещении, где вводят препарат, должны иметься средства противошоковой терапии.

Курс лечения состоит из 3-5 инъекций, проводимых ежедневно или через день, в зависимости от тяжести заболевания, состояния больного и терапевтического эффекта.

Побочное действие:

Могут развиваться гиперемия и повышение температуры до 37.5°С в течение первых суток после введения, а также диспепсические явления.

У отдельных лиц с измененной реактивностью могут развиваться аллергические реакции различного типа, а в исключительных случаях - анафилактический шок.

Передозировка:

Случаев передозировки не наблюдалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата в период беременности или кормления грудью возможно только по жизненным показаниям и после оценки соотношения пользы для матери и риска для плода или младенца.

Иммуноглобулин проникает в грудное молоко и может способствовать передаче защитных антител новорожденному.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Иммуноглобулин человека антистафилококковый совместим с другими лекарственными средствами, в частности, антибиотиками.

Имуноглобулин человека антистафилококковый следует вводить не ранее чем через 3 месяца после иммунизации живыми вирусными вакцинами.

Особые указания и меры предосторожности:

Лицам, страдающим аллергическими заболеваниями (бронхиальная астма, атопический дерматит, рецидивирующая крапивница) или склонным к аллергическим реакциям, в день введения иммуноглобулина и в течение последующих 8 дней рекомендуется назначение антигистаминных препаратов. В период обострения аллергического процесса введение препарата осуществляется по заключению аллерголога.

Лицам, страдающим аутоиммунными заболеваниями (болезни крови, соединительной ткани, нефрит и т.д.) препарат следует вводить на фоне соответствующей терапии.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Введение препарата не приводит к психомоторным нарушениям и реакциям, и не влияет на способность управлять транспортными средствами и другими механизмами.

Применение в детском возрасте

Для **детей до 5 лет** разовая доза препарата должна быть не менее 100 МЕ.

Условия хранения:

В сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре от 2 до 10°C.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Immunoglobulin_Cheloveka_Antistafilokokkovyy