

[Иммуноглобулин Человека Против Клещевого Энцефалита](#)



Код АТХ:

- [J06BB12](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Иммуноглобулин против клещевого энцефалита](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакотерапевтическая группа:

- [Иммунотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Иммуноглобулин против клещевого энцефалита представляет собой содержащую антитела к вирусу клещевого энцефалита фракцию белка, выделенную из сыворотки или плазмы иммунизированных доноров. Нейтрализует воздействие вируса клещевого энцефалита; формирует иммунитет в среднем в течение одного месяца.

Показания к применению:

Экстренная профилактика и лечение клещевого энцефалита.

Относится к болезням:

- [Энцефалит](#)

Противопоказания:

Аллергические реакции на препараты крови человека.

Способ применения и дозы:

Иммуноглобулин Человека Против Клещевого Энцефалита

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Экстренная профилактика проводится лицам, отметившим присасывание клещей в эндемичных по клещевому энцефалиту районах или при подозрении на лабораторное заражение. Иммуноглобулин вводят в/м однократно, 1 доза - 1 мл 10% раствора, содержащего указанную белковую фракцию. Детям до 12 лет - 1 мл; 12-16 лет - 2 мл; от 16 лет и старше - 3 мл. В случае повторного инфицирования возможно введение иммуноглобулина через 1 месяц после первого введения.

Для лечения вводят в/м по 3 мл каждые 10-12 ч в течение первых 3 дней. При тяжелых формах заболевания продолжают введение иммуноглобулина в тех же дозах до снижения температуры.

Побочное действие:

Редко: местная реакция в виде незначительной гиперемии. Повышенная температура до 37.5 °С редко держится более 24 ч после введения.

В единичных случаях: аллергические реакции, анафилактический шок.

Особые указания и меры предосторожности:

Лицам, страдающим аллергическими заболеваниями, возможно введение иммуноглобулина на фоне трехдневного курса антигистаминных препаратов.

После введения иммуноглобулина пациент должен находиться под наблюдением врача в течение не менее 30 мин.

Источник: http://drugs.thead.ru/Immunoglobulin_Cheloveka_Protiv_Kleshchevogo_Encefalita