

## Иммунокинд



### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

#### *Форма выпуска, описание и состав*

♦ **Таблетки для рассасывания гомеопатические для детей** от белого цвета, круглые, с фаской.

	<b>1 таб.</b>
Calcium carbonicum Hahnemanni D6	20 мг
Calcium fluoratum D6	20 мг
Calcium phosphoricum D6	20 мг
Sulfur jodatum D12	20 мг

Активный компонент получен методом твердофазного потенцирования с использованием лактозы моногидрата.

Вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая - 14.85 мг, тальк - 5 мг, магния стеарат - 0.15 мг.

150 шт. - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### *Фармакодинамика*

Комплексный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

### Показания к применению:

— профилактика ОРЗ, ускорение процессов выздоровления и повышение сопротивляемости организма к респираторным инфекциям у часто болеющих детей в возрасте до 6 лет.

### Относится к болезням:

- [Инфекции](#)
- [ОРЗ](#)

### Противопоказания:

— повышенная индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам препарата;

— дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

*С осторожностью*

— детский возраст до 3 лет.

## **Способ применения и дозы:**

При отсутствии иных указаний Иммунокинд следует принимать следующим образом: **дети от 0 до 6 лет** - по 1 таб. 3 раза/сут.

Таблетки принимают за полчаса до еды или через полчаса после еды, медленно рассасывая в полости рта. При лечении грудных детей и детей до 3-х лет таблетку следует тщательно измельчить в 5 мл (1 чайная ложка) воды и полученную суспензию дать ребенку выпить. Длительность применения лекарственного препарата составляет 21 день. При отсутствии улучшения или при появлении нежелательных явлений следует проконсультироваться с врачом.

## **Побочное действие:**

До настоящего времени побочные эффекты не известны. Возможны аллергические реакции.

Если вы заметили, что у вашего ребенка появляются признаки побочного эффекта после приема препарата Иммунокинд, сообщите об этом вашему врачу.

## **Передозировка:**

Случаи передозировки до настоящего времени не зарегистрированы.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Препарат не предназначен для применения при беременности и в период грудного вскармливания.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Не известны.

Если ваш ребенок принимает или принимал в недавнем прошлом другие медикаменты, в т.ч. и те, которые можно приобрести без рецепта, то сообщите об этом вашему врачу.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

При приеме гомеопатических лекарственных препаратов может отмечаться временное обострение симптомов и в этом случае следует обратиться к врачу.

Для пациентов, страдающих сахарным диабетом: содержание углеводов в максимальной суточной дозе препарата (6 таблеток) соответствует 0.041 хлебной единицы (ХЕ).

Следует соблюдать особую осторожность при применении препарата у детей грудного и младшего возраста (до 3 лет).

## **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в сухом, недоступном для детей месте при температуре от 15°C до 25°C.

Не использовать после истечения срока годности.

**Срок годности:**

5 лет.

**Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Immunokind>