

## [Имодиум плюс](#)



### Код АТХ:

- [A07DA53](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Лоперамид](#)
- [Симетикон](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Таблетки жевательные** белого цвета, круглые, плоские, с гравировкой "IMO" на одной стороне, с запахом ванили и мяты.

	<b>1 таб.</b>
лоперамида гидрохлорид	2 мг
симетикон	125 мг

*Вспомогательные вещества:* сахароза, целлюлоза микрокристаллическая, полиметакрилат, целлюлозы ацетат, сорбитол, декстраты (гидратированные), ароматизатор ванильно-мятный (природно-синтетический), натрия сахаринат, стеариновая кислота, кальция фосфат.

4 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.

6 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Противодиарейный препарат.

Лоперамид связывается с опиоидными рецепторами в стенке кишечника, что приводит к угнетению пропульсивной перистальтики, усилению резорбции воды и электролитов. Лоперамид не изменяет физиологическую микрофлору кишечника и повышает тонус анального сфинктера.

Симетикон является инертным поверхностно-активным соединением. Оказывает пеногасящее действие, и поэтому облегчает симптомы, связанные с диареей (метеоризм, абдоминальный дискомфорт, спастические боли).

Имодиум Плюс не оказывает центрального действия.

### Фармакокинетика

#### Всасывание

Лоперамид хорошо всасывается из кишечника. Симетикон не абсорбируется из ЖКТ.

#### Метаболизм

Лоперамид подвергается эффекту "первого прохождения", при этом почти полностью метаболизируется в печени и экскретируется с желчью в виде конъюгированных метаболитов. Вследствие интенсивного метаболизма концентрация в плазме крови неизмененного лоперамида очень низкая.

#### Выведение

$T_{1/2}$  лоперамида составляет в среднем 10.8 ч (диапазон от 9 до 14 ч). Метаболиты лоперамида выводятся с калом.

## Показания к применению:

— диарея любой этиологии и сопутствующие ей симптомы (метеоризм, абдоминальный дискомфорт, спастические боли).

## Относится к болезням:

- [Диарея](#)
- [Метеоризм](#)

## Противопоказания:

- острая дизентерия, которая характеризуется кровянистым стулом или высокой температурой (в качестве монотерапии);
- бактериальный энтероколит, вызванный *Salmonella* spp., *Shigella* spp., *Campylobacter* spp.;
- острый язвенный колит;
- псевдомембранозный колит, обусловленный антибиотикотерапией;
- детский возраст до 12 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

## Способ применения и дозы:

Препарат назначают **взрослым и детям старше 12 лет** в начальной дозе 2 таб., далее - по 1 таб. после каждого жидкого стула. Максимальная суточная доза - 4 таб. Продолжительность приема - не более 2 сут.

При применении препарата у **пациентов пожилого возраста** коррекции дозы не требуется.

При применении препарата у **пациентов с нарушениями функции почек** уменьшение дозы не требуется.

## Побочное действие:

Ниже перечисленные побочные эффекты классифицировали следующим образом: очень часто ( $\geq 10\%$ ), часто ( $\geq 1\%$ , но  $< 10\%$ ), нечасто ( $\geq 0.1\%$ , но  $< 1\%$ ), редко ( $\geq 0.01\%$ , но  $< 0.1\%$ ), очень редко ( $< 0.01\%$ ), включая единичные случаи.

**Аллергические реакции:** очень редко - кожная сыпь, крапивница, зуд; в единичных случаях - ангионевротический отек, буллезные высыпания (в т.ч. синдром Стивена-Джонсона), многоформная эритема, токсический эпидермальный некролиз, анафилактический шок, анафилактоидные реакции.

**Со стороны пищеварительной системы:** очень редко - искажение вкуса, боль в животе, тошнота, запор, вздутие живота, рвота, диспепсия, кишечная непроходимость, мегаколон (включая вариант токсического течения).

*Со стороны мочеполовой системы:* в единичных случаях - задержка мочи.

*Со стороны ЦНС:* очень редко - головокружение; в единичных случаях - сонливость.

Сообщения о нежелательных реакциях во время клинических и постмаркетинговых исследований лоперамида характерны для диарейного синдрома (сухость во рту, боль в животе, абдоминальный дискомфорт, тошнота, рвота, запор, вздутие живота, усталость, сонливость, головокружение). Поэтому установить достоверную связь между приемом препарата и вышеперечисленными симптомами довольно трудно.

## **Передозировка:**

Включает передозировку, обусловленную нарушениями функции печени.

*Симптомы:* угнетение ЦНС (ступор, нарушение координации движений, сонливость, миоз, повышение тонуса мышц, угнетение дыхания) и паралитическая непроходимость кишечника. У детей угнетение ЦНС может возникать чаще, чем у взрослых.

*Лечение:* антидот - налоксон. Поскольку лоперамид оказывает более длительное действие, чем налоксон (1-3 ч), может потребоваться дополнительное введение налоксона. Для выявления возможного угнетения ЦНС необходимо осуществлять наблюдение за пациентом в течение 48 ч.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Применение Имодиума Плюс при беременности (особенно в I триместре) возможно в случае строгих показаний.

Небольшое количество лоперамида проникает в грудное молоко. Поэтому не рекомендуется применять препарат в период грудного вскармливания.

В настоящее время не установлено тератогенное или эмбриотоксическое действие лоперамида и симетикона.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

За исключением препаратов, обладающих сходным фармакологическим действием, по причине взаимного усиления эффектов, взаимодействия с другими лекарственными препаратами не установлено.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

С осторожностью следует назначать Имодиум Плюс пациентам с нарушениями функции печени, т.к. у них замедлен метаболизм "первого прохождения". В этих случаях необходим контроль изменения состояния здоровья пациента.

Поскольку лечение препаратом Имодиум Плюс симптоматическое, необходимо проводить одновременно этиотропную и регидратационную терапию.

При отсутствии клинического улучшения в течение 48 ч прием Имодиума Плюс следует прекратить. Пациент должен быть информирован, что в данной ситуации необходима консультация врача.

Имодиум Плюс не рекомендуется применять в случаях, когда следует избегать угнетения перистальтики.

При возникновении запора и/или вздутия живота в процессе лечения Имодиумом Плюс лечение препаратом следует сразу же прекратить.

### *Использование в педиатрии*

Препарат не назначают **детям в возрасте до 12 лет.**

### *Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

Имодиум Плюс не оказывает влияния на скорость психических и физических реакций. Однако пациенты, у которых после приема препарата отмечаются сонливость, усталость или головокружение, должны воздерживаться от вождения автомобиля и работы с потенциально опасными механизмами.

### **При нарушениях функции почек**

При применении препарата у **пациентов с нарушениями функции почек** уменьшение дозы не требуется.

---

## **Имодиум плюс**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

### ***При нарушениях функции печени***

С осторожностью следует назначать Имодиум плюс пациентам с нарушениями функции печени.

### ***Применение в пожилом возрасте***

При применении препарата у **пациентов пожилого возраста** коррекции дозы не требуется.

### ***Применение в детском возрасте***

Противопоказание: детский возраст до 12 лет.

## **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре от 15° до 30°С.

## **Срок годности:**

3 года.

## **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Imodium\\_plyus](http://drugs.thead.ru/Imodium_plyus)