

Имовакс Полио



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Вакцина для профилактики полиомиелита](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС](#) [VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Вакцина против вирусов полиомиелита 1, 2 и 3 типов. Получают из вирусов полиомиелита трех типов, культивируемых на клеточной линии ВЕРО и инактивированных формалином.

Данная вакцина вызывает выработку значительного количества нейтрализующих антител к вирусам полиомиелита, начиная со второй инъекции, независимо от общего состояния вакцинируемых лиц (иммунодефицит, заболевания кишечника, дистрофия). Иммунитет к вирусам полиомиелита приобретаетcя после 3-й инъекции вакцины, усиливается при последующих ее введениях и сохраняется в течение, как минимум, 5 лет после первой ревакцинации.

После введения 3 доз данной вакцины сероконверсия наблюдается у 95-100% лиц.

Показания к применению:

Профилактика полиомиелита.

Относится к болезням:

- [Полиомиелит](#)

Противопоказания:

Острые инфекционные заболевания; аллергические реакции на стрептомицин.

Способ применения и дозы:

Вакцину вводят п/к или в/м. Первичную вакцинацию проводят путем 3 последовательных инъекций данной вакцины с интервалом в 1 мес. Для одного введения - 1 доза вакцины. Ревакцинацию проводят через 1 год после завершения

курса первичной вакцинации, затем - каждые 5-10 лет.

Побочное действие:

Редко - повышение температуры тела; возможна незначительная эритема в месте инъекции.

Особые указания и меры предосторожности:

Данная вакцина может быть использована в комбинации с другими вакцинами для инъекций, в т.ч. с вакцинами для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита В и инфекций, вызываемых *Haemophilus influenzae* типа b.

Источник: http://drugs.thead.ru/Imovaks_Polio