Имудон



Код АТХ:

- L03AX

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Corynebacterium pseudodiphtheriticum
- Enterococcus faecalis
- Enterococcus faecium
- Fusobacterium nucleatum subsp
- Candida albicans

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] [МНН] [МНН] [МНН] [МНН] Википедия[МНН] [МНН] [МНН] [МНН] [МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Таблетки для рассасывания*** белого или почти белого цвета, плоскоцилиндрические, с гладкой блестящей поверхностью, со скошенными краями, с мятным запахом, допускается незначительная мраморность.

	1 таб.
смесь лизатов бактерий (Имудон)	2.7 мг,
в т.ч.: лизаты бактерий: Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus delbrueckii ss lactis, Lactobacillus helveticus, Lactobacillus fermentum, Streptococcus pyogenes groupe A, Streptococcus sangius groupe H, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Enterococcus faecalis, Klebsiella pneumoniae ss pneumoniae, Fusobacterium nucleatum ss fusiforme, Corynebacterium pseudodiphtheriticum, Candida albicans	0.1575 мг
вспомогательные вещества: глицин - 2 мг, натрия дезоксихолат - 0.53 мг, тиомерсал - не более 0.0125 мг.	

Вспомогательные вещества: глицин - 47.3 мг, лактозы моногидрат - 350 мг, маннитол - 100 мг, натрия сахаринат - 1.12 мг, повидон - 10 мг, натрия гидрокарбонат - 30 мг, лимонная кислота безводная - 23 мг, ароматизатор мятный - 8 мг, магния стеарат - 4.88 мг.

8 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.
8 шт. - упаковки ячейковые контурные (5) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Иммунотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Иммуностимулирующий препарат бактериального происхождения для местного применения в оториноларингологии, стоматологии. Представляет собой поливалентный антигенный комплекс, смесь лизатов бактерий, состав которой соответствует возбудителям, наиболее часто вызывающим воспалительные процессы в полости рта и глотки.

Имудон активирует фагоцитоз, способствует увеличению количества иммунокомпетентных клеток, повышает выработку лизоцима и интерферона, иммуноглобулина А в слюне.

Фармакокинетика

В инструкции данной информации нет.

Показания к применению:

Лечение и/или профилактика воспалительных и инфекционных заболеваний полости рта и глотки:

— фарингит;

— хронический тонзиллит;

— предоперационная подготовка и послеоперационный период после тонзиллэктомии;

— поверхностные и глубокие пародонтозы, пародонтит, стоматит (в т.ч. афтозный), глоссит;

— эритематозный и язвенный гингивит;

— дисбактериоз полости рта;

— инфекции после удаления зубов, имплантации искусственных зубных корней;

— изъязвления, вызванные зубными протезами.

Относится к болезням:

- Гингивит
- Дисбактериоз
- Инфекции
- Пародонтит
- Стоматит
- Тонзиллит
- Фарингит
- Эритема
- Язвенный гингивит

Противопоказания:

— аутоиммунные заболевания;

— детский возраст до 3 лет;

— повышенная индивидуальная чувствительность к препарату или его компонентам.

Способ применения и дозы:

Взрослым и подросткам старше 14 лет при *острых воспалительных заболеваниях полости рта и глотки и обострении хронических заболеваний* препарат назначают в дозе 8 таб./сут. Таблетки рассасывают (не разжевывая) в полости рта с интервалом 1-2 ч. Средняя продолжительность курса лечения - 10 дней.

Для *профилактики обострения хронических воспалительных заболеваний полости рта и глотки* препарат назначают в дозе 6 таб./сут. Таблетки рассасывают (не разжевывая) в полости рта с интервалом 2 ч. Продолжительность курса лечения - 20 дней.

Рекомендуется проводить профилактические курсы 3-4 раза в год.

Детям в возрасте от 3 до 14 лет при *лечении острых и обострении хронических воспалительных заболеваний полости рта и глотки* препарат назначают в дозе 6 таб./сут. Таблетки рассасывают (не разжевывая) в полости рта с интервалом 1-2 ч. Продолжительность курса лечения при острых заболеваниях - 10 дней, для профилактики обострения хронических заболеваний - 20 дней.

Курс профилактического применения рекомендуется повторять 3-4 раза в год.

Побочное действие:

Аллергические реакции: редко - кожная сыпь, крапивница, ангионевротический отек.

Со стороны пищеварительной системы: редко - тошнота, рвота, боли в животе.

Со стороны дыхательной системы: редко - обострение бронхиальной астмы, кашель.

Дерматологические реакции: очень редко - узловатая эритема.

Со стороны свертывающей системы крови: очень редко - геморрагический васкулит, тробоцитопения.

Прочие: редко - повышение температуры тела.

Передозировка:

Случаев передозировки препарата Имудон не описано.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Информация об использовании Имудона при беременности недостаточна. Соответствующие данные экспериментов на животных и эпидемиологические исследования отсутствуют.

Не рекомендуется принимать Имудон при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие не отмечено. Имудон можно применять одновременно с другими лекарственными препаратами.

Особые указания и меры предосторожности:

Не следует принимать пищу и воду, а также полоскать рот в течение 1 ч после применения Имудона, чтобы не снижать терапевтическую эффективность препарата.

При назначении препарата пациентам, соблюдающим бессолевую или малосолевую диету, необходимо учитывать, что 1 таб. Имудона содержит 15 мг натрия.

Пациентам с бронхиальной астмой, у которых прием препаратов, содержащих бактериальные лизаты, вызывает обострение заболевания (приступ бронхиальной астмы), применять препарат не рекомендуется.

Использование в педиатрии

Дети в возрасте от 3 до 6 лет должны рассасывать таблетки под обязательным наблюдением взрослых.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Нет данных, свидетельствующих о необходимости каких-либо ограничений деятельности, связанной с управлением автомобилем или другими механизмами в период лечения.

Применение в детском возрасте

Дети в возрасте от 3 до 6 лет должны рассасывать таблетки под наблюдением взрослых.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C. Хранить и транспортировать препарат следует в соответствии с СП3.3.2.1248-03 при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Imudon