

Иналан



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Таблетки жевательные	1 таб.
кальция карбонат	680 мг
магния карбонат	80 мг

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (4) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (6) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (8) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Антацидное средство. Нейтрализует свободную HCl в желудке, снижает активность желудочного сока, устраняет гастралгию, изжогу.

Показания к применению:

- острый гастрит;
- хронический гастрит с повышенной и нормальной секреторной функцией желудка (в фазе обострения);
- острый дуоденит;
- язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки (в фазе обострения);
- симптоматические язвы различного генеза;
- эрозии слизистой оболочки ЖКТ;
- рефлюкс-эзофагит;
- грыжа пищеводного отверстия диафрагмы;
- гастралгия, изжога после избыточного употребления этанола, никотина, кофе, приема лекарственных средств,

погрешностей в диете.

Относится к болезням:

- [Гастрит](#)
- [Грыжа](#)
- [Дуоденит](#)
- [Изжога](#)
- [Рефлюкс-эзофагит](#)
- [Эзофагит](#)
- [Язвенная болезнь](#)
- [Язвенная болезнь желудка](#)

Противопоказания:

- хроническая почечная недостаточность;
- гиперкальциемия;
- гиперчувствительность.

Способ применения и дозы:

Внутрь, по 2 таблетки (рассасывать одну за другой); при необходимости повторяют прием каждые 2 часа. Высшая суточная доза - 16 таблеток.

Побочное действие:

Аллергические реакции, диарея, гипермагниемия, гиперкальциемия (у больных с почечной недостаточностью).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении уменьшает абсорбцию индометацина, салицилатов, хлорпромазина, фенитоина, H₂-гистаминоблокаторов, бета-адреноблокаторов, дифлунизала, изониазида, антибиотиков тетрациклинового ряда, дикумариновых антикоагулянтов, барбитуратов, препаратов железа (перечисленные лекарственные средства следует применять за 1 час до или через 1 час после приема Иналана). Антихолинергические лекарственные средства усиливают и удлиняют действие, замедляя опорожнение желудка. Усиливает эффект сульфадиазина, леводопы, ацетилсалициловой кислоты и налидиксовой кислоты.

Особые указания и меры предосторожности:

Препарат не предназначен для длительного применения.

При нарушениях функции почек

Противопоказан при хронической почечной недостаточности.

Условия хранения:

В сухом и недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Иналан

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Inalan>