Иналан



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Таблетки жевательные	**1 таб.**
кальция карбонат	680 мг
магния карбонат	80 мг

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (4) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (6) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (8) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Антацидное средство. Нейтрализует свободную HCl в желудке, снижает активность желудочного сока, устраняет гастралгию, изжогу.

Показания к применению:

— острый гастрит;

— хронический гастрит с повышенной и нормальной секреторной функцией желудка (в фазе обострения);

— острый дуоденит;

— язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки (в фазе обострения);

— симптоматические язвы различного генеза;

— эрозии слизистой оболочки ЖКТ;

— рефлюкс-эзофагит;

— грыжа пищеводного отверстия диафрагмы;

— гастралгия, изжога после избыточного употребления этанола, никотина, кофе, приема лекарственных средств,

погрешностей в диете.

Относится к болезням:

- Гастрит
- Грыжа
- Дуоденит
- Изжога
- Рефлюкс-эзофагит
- Эзофагит
- Язвенная болезнь
- Язвенная болезнь желудка

Противопоказания:

— хроническая почечная недостаточность;

— гиперкальциемия;

— гиперчувствительность.

Способ применения и дозы:

Внутрь, по 2 таблетки (рассасывать одну за другой); при необходимости повторяют прием каждые 2 часа. Высшая суточная доза - 16 таблеток.

Побочное действие:

Аллергические реакции, диарея, гипермагниемия, гиперкальциемия (у больных с почечной недостаточностью).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении уменьшает абсорбцию индометацина, салицилатов, хлорпромазина, фенитоина, H_2-гистаминоблокаторов, бета-адреноблокаторов, дифлунизала, изониазида, антибиотиков тетрациклинового ряда, дикумариновых антикоагулянтов, барбитуратов, препаратов железа (перечисленные лекарственные средства следует применять за 1 час до или через 1 час после приема Иналана). Антихолинергические лекарственные средства усиливают и удлиняют действие, замедляя опорожнение желудка. Усиливает эффект сульфадиазина, леводопы, ацетилсалициловой кислоты и налидиксовой кислоты.

Особые указания и меры предосторожности:

Препарат не предназначен для длительного применения.

При нарушениях функции почек

Противопоказан при хронической почечной недостаточности.

Условия хранения:

В сухом и недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Inalan