

Индигокармин



Код АТХ:

- [V04CH02](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Индигокармин](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС](#) [VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакотерапевтическая группа:

- [Диагностические средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Диагностическое средство. Применение индиго кармина основано на его способности быстро выделяться в неизменном виде с мочой, не вызывая нарушения функции почек. При нормальной функции почек начинает выделяться из мочеточников через 2-3 мин.

Показания к применению:

Для исследования выделительной функции почек и динамической деятельности почечных лоханок и мочеточников (хромоцистоскопическая проба).

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к индиго кармину.

Способ применения и дозы:

Вводят в/в медленно (подогретым до температуры тела) взрослым по 4-5 мл, детям - по 2-3 мл. При необходимости вводят в/м в объеме 20 мл.

Побочное действие:

Возможно: головокружение, тошнота, озноб.

Особые указания и меры предосторожности:

Следует учитывать, что замедление выделения индиго кармина возможно при хронической сердечной недостаточности, артериальной гипертензии и других заболеваниях, сопровождающихся нарушением почечного кровотока.

Раствор индиго кармина можно также вводить в полости и свищи для выявления нарушений целостности полости и протяженности свищевых ходов. При подозрении на одностороннее поражение почек при проведении хромоцистоскопической пробы следует произвести катетеризацию мочеточников.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Indigokarmin>