

## [Индигокармин \(раствор\)](#)



### **Код АТХ:**

- [V04CH02](#)

### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Индигокармин](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Фармакотерапевтическая группа:**

- [Диагностические средства](#)

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Диагностическое средство. Применение индиго кармина основано на его способности быстро выделяться в неизменном виде с мочой, не вызывая нарушения функции почек. При нормальной функции почек начинает выделяться из мочеточников через 2-3 мин.

### **Показания к применению:**

Для исследования выделительной функции почек и динамической деятельности почечных лоханок и мочеточников (хромоцистоскопическая проба).

### **Противопоказания:**

Повышенная чувствительность к индиго кармину.

### **Способ применения и дозы:**

Вводят в/в медленно (подогретым до температуры тела) взрослым по 4-5 мл, детям - по 2-3 мл. При необходимости вводят в/м в объеме 20 мл.

## **Побочное действие:**

*Возможно:* головокружение, тошнота, озноб.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Следует учитывать, что замедление выделения индиго кармина возможно при хронической сердечной недостаточности, артериальной гипертензии и других заболеваниях, сопровождающихся нарушением почечного кровотока.

Раствор индиго кармина можно также вводить в полости и свищи для выявления нарушений целостности полости и протяженности свищевых ходов. При подозрении на одностороннее поражение почек при проведении хромоцистоскопической пробы следует произвести катетеризацию мочеточников.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Indigokarmin\\_rastvor](http://drugs.thead.ru/Indigokarmin_rastvor)