

## Индинол



### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Форма выпуска:**

#### **Форма выпуска, описание и состав**

##### **Состав**

Ингредиентный состав на 1 капсулу 300 мг:

Компонент: *экстракт растений семейства крестоцветных*, 100 мг, 33,3%

Вспомогательные вещества: *лактоза*, 90 мг, 30,0%; *крахмал*, 80 мг, 26,7%, *целлюлоза микрокристаллическая*, 27 мг, 9,0%; *магния стеарат*, 3 мг, 1,0%.

Действующие вещества: каждая капсула содержит не менее 90 мг индол-3-карбинола.

##### **Форма выпуска**

Капсулы, массой содержимого 300 мг. Капсулы в блистерах 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120 капсул в упаковке (10, 20 капсул в блистере). Капсулы в полимерных банках с крышкой 60, 80, 90, 100, 120 в банке. Допускается упаковка банки в пачку потребительскую.

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Индинол® является универсальным корректором патологических гиперпластических процессов в органах и тканях женской репродуктивной системы (молочной железе, эндометрии, миометрии, шейке матки, яичниках). Нормализует баланс эстрогенов в организме и подавляет их негативное симулирующее влияние, а также блокирует другие (гормон-независимые) механизмы, активирующие патологический клеточный рост в тканях молочной железы и матки. Обладает способностью вызывать избирательную гибель трансформированных клеток с аномально высокой пролиферативной активностью.

### **Показания к применению:**

Индинол® рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище - дополнительного источника индол-3-карбинола.

Индинол® рекомендуется использовать:

- для профилактики фиброзно-кистозной мастопатии и в составе ее комплексного лечения, а также для коррекции функциональных состояний молочных желез, обусловленных данной патологией;
- в сочетании с БАД Эпигаллат® в комплексном терапевтическом лечении эндометриоза, аденомиоза, миомы матки и гиперплазии эндометрия без атипии, а также для профилактики рецидивов указанных заболеваний после хирургического лечения;
- при комплексном лечении заболеваний генитальной сферы у женщин, ассоциированных с вирусом папилломы человека: дисплазии шейки матки (внутриэпителиальной цервикальной неоплазии), аногенитальном кондиломатозе.

## Относится к болезням:

- [Аденомиоз](#)
- [Кондиломы](#)
- [Мастит](#)
- [Мастопатия](#)
- [Папиллит](#)
- [Фиброз](#)
- [Фиброма](#)
- [Эндометрит](#)

## Противопоказания:

Индиол® противопоказан при индивидуальной непереносимости компонентов препарата. Не рекомендуется беременным и кормящим женщинам, а также лицам, принимающим препараты, снижающие кислотность желудочного сока. Не является лекарственным средством. Отпускается через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы торговой сети. Не содержит ГМО.

## Способ применения и дозы:

Женщинам, страдающим фиброзно-кистозной мастопатией, Индиол® рекомендуется принимать внутрь, по 1 капсуле 3 раза в день во время еды в течение 1 месяца. В составе комбинированной терапии (гиперплазия эндометрия без атипии, эндометриоз, аденомиоз, миома матки) Индиол® рекомендуется принимать внутрь в сочетании с БАД Эпигаллат® (1 капсула +1 капсула) 3 раза во время еды в течение 2-3 недель. Возможно более длительное применение по рекомендации врача. При заболеваниях генитальной сферы, ассоциированных с вирусом папилломы человека, Индиол® рекомендуется принимать внутрь по 1 капсуле 3 раза в день в сочетании с препаратами - иммуномодуляторами, используемыми в качестве стандартного лечения данных заболеваний. При этом курс лечения необходимо проходить обоим половым партнерам.

## Побочное действие:

Диагнозы

- Рак молочной железы

## Условия хранения:

Хранить при температуре не выше 25 °С в защищенном от света, недоступном для детей месте.

## Срок годности:

2 года.

## Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

**Индинол**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Indinol>