Индометацин (мазь)



Код АТХ:

- M01AB01

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Индометацин

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Мазь для наружного применения 10%*** гомогенная, от желтого до желто-коричневого цвета.

	1 г
индометацин	100 мг

Вспомогательные вещества: холестерол, стеариловый спирт, диметилсульфоксид, воск белый, ланолин безводный, вазелин.

40 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Ненаркотические анальгетики, включая нестероидные и другие противовоспалительные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Индометацин оказывает местное обезболивающее, противовоспалительное и противоотечное действие.

При наружном применении устраняет боль, уменьшает отек и эритему, способствует уменьшению утренней скованности и припухлости суставов, способствует увеличению объема движений.

Показания к применению:

— заболевания опорно-двигательного аппарата: ревматоидный артрит, псориатический артрит, анкилозирующий спондилоартрит, остеоартроз периферических суставов и позвоночника, боль в нижней части спины;

— мышечные боли ревматического и неревматического происхождения;

— травматическое повреждение мягких тканей.

Относится к болезням:

- Анкилозирующий спондилоартрит
- Артрит
- Артроз
- Остеоартрит
- Остеоартроз
- Псориаз
- Ревматизм
- Спондилоартрит
- Травмы

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к индометацину, другим НПВС, или другим компонентам препарата;

— язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (в стадии обострения);

— гипокоагуляция;

— беременность и период лактации;

— детский возраст (до 14 лет);

— нарушение целостности кожных покровов.

С осторожностью: одновременное применение препарата с другими НПВС, бронхиальная астма, аллергический ринит, полипы слизистой носа.

Способ применения и дозы:

Мазь втирают тонким слоем в кожу болезненых участков тела 2-3 раза/сут. Разовая доза для **взрослых** составляет 4-5 см выдавленной из тюбика мази, а для **детей старше 14 лет** - 2-2.5 см.

Суточная доза не должна превышать 15 см для взрослых и 7.5 см для детей.

Побочное действие:

Возможны местные побочные эффекты: зуд, покраснение, сыпь, аллергические реакции, зуд и гиперемия кожи, жжение. При *длительном применении* - системные проявления. В *единичных случаях* - обострение псориаза.

Необходимо сообщать лечащему врачу о всех побочных (необычных) эффектах, особенно не указанных в инструкции.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан во время беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Индометацин снижает эффективность уриkозурических препаратов, гипотензивных и мочегонных средств (салуретиков); усиливает действие непрямых антикоагулянтов, антиагрегантов, фибринолитиков, побочные эффекты минералокортикостероидов, эстрогенов, др. НПВС; усиливает гипогликемический эффект производных сульфонилмочевины.

Совместное использование с парацетамолом повышает риск развития нефротоксических эффектов.

Этанол, колхицин, ГКС - повышают риск развития гастроинтестинальных осложнений, сопровождаемых кровотечениями.

Увеличивает концентрацию в крови препаратов лития, метотрексата, дигоксина и пенициллинов (блокада канальцевой секреции).

Циклоспорин, препараты золота повышают нефротоксичность индометацина.

Цефамандол, цефоперазон, вальпроевая кислота - повышают риск развития гипопротромбинемии и опасность кровотечений.

Потенцирует токсическое действие зидовудина.

Особые указания и меры предосторожности:

Препарат следует наносить только на неповрежденные участки кожи. Избегать попадания мази на открытые раны, в глаза и на другие слизистые оболочки.

Применение в детском возрасте

Препарат противопоказан детям до 14 лет.

Условия хранения:

В защищенном от света, недоступном для детей месте, при температуре не выше 25°С.

Не использовать по истечении указанного срока годности.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Indometacin_maz