

## Индометацин (мазь)



### Код АТХ:

- [M01AB01](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Индометацин](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Мазь для наружного применения 10%** гомогенная, от желтого до желто-коричневого цвета.

индометацин	1 г
	100 мг

*Вспомогательные вещества:* холестерол, стеариловый спирт, диметилсульфоксид, воск белый, ланолин безводный, вазелин.

40 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Ненаркотические анальгетики, включая нестероидные и другие противовоспалительные средства](#)

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Индометацин оказывает местное обезболивающее, противовоспалительное и противоотечное действие.

При наружном применении устраняет боль, уменьшает отек и эритему, способствует уменьшению утренней скованности и припухлости суставов, способствует увеличению объема движений.

### Показания к применению:

— заболевания опорно-двигательного аппарата: ревматоидный артрит, псориатический артрит, анкилозирующий спондилоартрит, остеоартроз периферических суставов и позвоночника, боль в нижней части спины;

— мышечные боли ревматического и неревматического происхождения;

— травматическое повреждение мягких тканей.

### Относится к болезням:

- [Анкилозирующий спондилоартрит](#)
- [Артрит](#)
- [Артроз](#)
- [Остеоартрит](#)
- [Остеоартроз](#)
- [Псориаз](#)
- [Ревматизм](#)
- [Спондилоартрит](#)
- [Травмы](#)

### Противопоказания:

- повышенная чувствительность к индометацину, другим НПВС, или другим компонентам препарата;
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (в стадии обострения);
- гипокоагуляция;
- беременность и период лактации;
- детский возраст (до 14 лет);
- нарушение целостности кожных покровов.

*С осторожностью:* одновременное применение препарата с другими НПВС, бронхиальная астма, аллергический ринит, полипы слизистой носа.

### Способ применения и дозы:

Мазь втирают тонким слоем в кожу болезненных участков тела 2-3 раза/сут. Разовая доза для **взрослых** составляет 4-5 см выдавленной из тюбика мази, а для **детей старше 14 лет** - 2-2.5 см.

Суточная доза не должна превышать 15 см для взрослых и 7.5 см для детей.

### Побочное действие:

*Возможны* местные побочные эффекты: зуд, покраснение, сыпь, аллергические реакции, зуд и гиперемия кожи, жжение. При *длительном применении* - системные проявления. В *единичных случаях* - обострение псориаза.

Необходимо сообщать лечащему врачу о всех побочных (необычных) эффектах, особенно не указанных в инструкции.

### Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан во время беременности и в период лактации.

### Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Индометацин снижает эффективность урикозурических препаратов, гипотензивных и мочегонных средств (салуретиков); усиливает действие непрямых антикоагулянтов, антиагрегантов, фибринолитиков, побочные эффекты минералокортикостероидов, эстрогенов, др. НПВС; усиливает гипогликемический эффект производных сульфонилмочевины.

Совместное использование с парацетамолом повышает риск развития нефротоксических эффектов.

Этанол, колхицин, ГКС - повышают риск развития гастроинтестинальных осложнений, сопровождаемых кровотечениями.

## **Индометацин (мазь)**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

Увеличивает концентрацию в крови препаратов лития, метотрексата, дигоксина и пенициллинов (блокада канальцевой секреции).

Циклоспорин, препараты золота повышают нефротоксичность индометацина.

Цефамандол, цефоперазон, вальпроевая кислота - повышают риск развития гипопротромбинемии и опасность кровотечений.

Потенцирует токсическое действие зидовудина.

### **Особые указания и меры предосторожности:**

Препарат следует наносить только на неповрежденные участки кожи. Избегать попадания мази на открытые раны, в глаза и на другие слизистые оболочки.

#### ***Применение в детском возрасте***

Препарат противопоказан детям до 14 лет.

### **Условия хранения:**

В защищенном от света, недоступном для детей месте, при температуре не выше 25°C.

Не использовать по истечении указанного срока годности.

### **Срок годности:**

2 года.

### **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Indometacin\\_maz](http://drugs.thead.ru/Indometacin_maz)